



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ ... *Р.В.М.-407*

София, *10.03.* 2016 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 3982/07.03.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11838/28.07.2015 г. на "Лаинко С.А.", Испания, упълномощен представител "Химконсулт" ООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: БРАИ

Активно вещество: Пирипроксифен – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита – "Лаинко С.А.", Испания

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,1 л, 0,25 л, 1 л. – бутилки - HDPE/COEX; 5 л. – бидони HDPE/COEX; 0,5 л – бутилки - COEX/HDPE/EVON; 1 л. - бутилки - COEX/PA

Забележки:

- При смесване, зареждане и приложение на продукта и повторно влизане в третираните площи да се носят предпазно облекло и лични предпазни средства.
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностните води или 10 метра с дюзи намаляващи със 75% отвяването на струята, с цел опазване на водните организми – при цитрусови култури;
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностните води или 15 метра с дюзи намаляващи със 75% отвяването на струята, с цел опазване на водните организми – при овощните култури;
- Опасен за пчелите./Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. /Да не се използва, където има активна паша на пчели./Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност./Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. За предпазване на опрашващите насекоми при домати в оранжерии, кошерите да се покрият по време на приложението на продукта и 48 часа след това.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Мл. продукт /дка Мин/ макс	Вода литра/ дка	Грама а.в./дка		
БРАИ	Портокали, мандарини, лимони	П	Щитососни въшки – <i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Saissetia oleae</i>	Пирипроксифен – 100 г/л	ЕК	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 71-74 Разрастване на яйчника, окапване на завръзи след цъфтежа – Плодовете достигат 40% от нормалната големина. Край на физиологичното окапване на тъмнозелените плодове	1	-	50-112,5 мл/дка	100-150 л/дка	5-11,25 г./дка	30 дни	<p>✓ За да се избегне поява на резистентност – да не се извършва повече от 1 третиране за вегетационен период.</p> <p>✓ Да не се надвишава дозата от 125 мл. продукт/дка</p>

Ябълки и круши	II	Калифорнийск а щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	Пирипроксифен – 100 г/л	ЕК	Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 54-72 Фаза „Миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяна на първите листа – Размер на завръза до 20 мм	1	-	28-50 мл/дка	70-100 л/дка	2,8-5 г/дка	-	✓ За да се избегне поява на резистентн ост – да не се извършва повече от 1 третиране за вегетацион ен период. ✓ Да не се надвишава дозата от 50 мл. продукт/дка
Праскови, кайсии, сливи, череши					Конвенцион ална наземна техника	ВВСН 55-82 Пето съцветие, пети цвят – 20 % от плодовете с типичен цвят на зреене	2	10 дни	50-112,5 мл/дка	100-150 л/дка	5-11,25 г./дка	3 дни	✓ За да се избегне поява на резистентн ост – да не се извършва повече от 2 третираня за вегатацион ен период. ✓ Да не се надвишава дозата от 112,5 мл. продукт/дка
Домати	O	Тютонева белокрылка – (<i>Bemisia tabaci</i>), Оранжерийна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)											

БРАИ

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в затрито помещение (З)
- (c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GСРР Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на ползването
- (l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност при вдишване, кат.1	H304 H315	GHS05 GHS07	H304 H315	EUN401	SP фрази: SP1 SPe3
Дразнене на кожата, кат.2	H317 H318	GHS08 GHS09	H317 H318		
Кожна сенсibiliзация, кат.1	H400 H410	Опасно	H410		SPe8, SPo2 SPo5
Увреждане на очите, кат. 1					
Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1					
Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1					

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на което изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2019 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на "Лаинко С.А.", Испания.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

