



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД 09-457

София, 10. 07. 2007 год.

На основание чл. 15з, ал. 3 във връзка с ал. 6 от Закона за защита на растенията и чл. 11, ал. 14 във връзка с чл. 16 от Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 81 от 2006 г.)

ПРОДЪЛЖАВАМ:

за период от 3 / три / години срока на разрешаване на следните продукти за растителна защита:

ФУНГИЦИДИ

СТРОБИ ДФ

крезоксим-метил - 50 %

Производство на ф. "БАСФ" - Германия.

Срещу:

-брашнеста мана по ябълка (*Podosphaera leucotricha*) в концентрация 0,02 % (20 г/дка) при разход 100 л/дка работен разтвор;

-струпяване по ябълка (*Venturia inaequalis*) в концентрация 0,02 % (20 г/дка) при разход 100 л/дка раб. р-р;

-оидиум по лоза (*Oidium tuckeri*) в концентрация 0,02 % (20 г/дка) при разход 100 л/дка раб. р-р;

-оидиум по лоза (*Oidium tuckeri*) в комбинация с Акробат МЦ в концентрация 0,015 % Строби ДФ и 0,15 % Акробат МЦ.

Категория на употреба: за свободна употреба.

Карантинен срок: 35 дни.

R фрази: R 40; R 51/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 36/37; 46; 57.

ИНСЕКТИЦИДИ

БАНДИТ 10 ЕВ
циперметрин - 100 г/л

Производство на ф. "Транскем профешенъл" -
Холандия.

За обеззаразяване на празни складове чрез влажна
дизинсекция срещу:

-житна гърица (*Sitophilus granarius*), оризова гърица
(*Sitophilus oryzae*), зърнов бръмбар (*Rhizoperla
dominica*), ръждивочервен брашмян бръмбар (*Tribolium
castaneum*), Суринамски брашнояд (*Oryzaephilus
surinamensis*), ръждаво-червен зърнов бръмбар
(*Cryptolestes ferrogineus*) в доза 0,8 мл препарат+12 мл
вода за 10 м³ при третиране с електрически аерозолен
генератор за студен аерозол М 1026 или в
концентрация 0,1 % и разход на работен разтвор 0,5
л/м² при третиране с тракторна пръскачка с монтиран
шланг и щека за пръскане. Експозиция 48 часа.

Категория на употреба: II.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 20/22; R 36/37/38; R 51/53.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 26; S 28; S 36/37/38.

ВЕНИШ
металдехид - 4 %

Производство на ф. "Транскем Профешенъл" -
Холандия.

Срещу:

-голи охлюви (сем. *Limacidae*) в доза 300 г/дка - за
площно третиране при разсади и редово (от двете страни
на растенията) при другите култури.

Категория на употреба: III.

Карантинен срок: не се изисква.

R фрази: R 10; R 22.

S фрази: S 2; S 13; S 20/22.

ДЕЦИС 2,5 ЕК
делтаметрин - 25 г/л

Производство на ф. "Байер КропСайанс" - Германия.

Срещу:

-листозавивачки при овощни култури (*Argeroplaca
variagana; Tmetocera ocellana*) в концентрация 0,03 %;

-черешова муха (*Rhagoletis cerasi*) в концентрация 0,03
%;

-крушова листна бълха (*Psylla pyri*) в концентрация 0,03
%;

-ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*) в
концентрация 0,03 %;

-ябълкова плодова оса (*Hoplocampa testudinea*) в
концентрация 0,03 %;

-зелена ябълкова листна въшка () в концентрация 0,03
%;

-лозова пъстрянка по лоза (*Yno ampelophaga*) в
концентрация 0,04 %;

-обикновена сливова щитоносна въшка

(*Parthenolecanium corni*) в концентрация 0,04 %;

- гроздови молци (*Lobesia botrana*; *Eupoecilia ambiguella*) в концентрация 0,04 %;
- източен плодов червей (*Laspeyresia molesta*) в концентрация 0,04 %;
- листоминиращи молци (*Cameraria ohridella*) в концентрация 0,04 %;
- бадемов семеяд (*Eurytoma amygdali*) в концентрация 0,04 %;
- черна сливова плодова оса (*Hoplocampa minuta*) в концентрация 0,05 %;
- сливов плодов червей (*Laspeyresia funebrana*) в концентрация 0,05 %;
- оранжерийна белокрылка по зеленчукови култури в оранжерии (*Trialeurodes vaporariorum*) в концентрация 0,05 %;
- листни въшки по хризантема в концентр. 0,05 %;
- цвеклови бълхи (*Chaetocnema concinna*; *Ch. breviscula*; *Ch. Tibialis*) в доза 20 мл/дка;
- грахова листна въшка по грах (*Acyrtosiphon pisi*) в доза 20 мл/дка;
- колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*) в доза 20-30 мл/дка;
- ларви на вредна житна дървеница (*Eurygaster integriceps*) в доза 30 мл/дка;
- фасулев зърнояд (*Acanthoscelides obtectus*) в доза 40 мл/дка;
- обикновена житна пиявица (*Oulema melanopa*) в доза 40 мл/дка;
- маков листояд (*Entomoscelis sultator*) в доза 40 мл/дка;
- цвеклови щитовки - ларви (*Cassida nebulosa*; *C. nobilis*) в доза 50 мл/дка;
- оранжерийна белокрылка по тютюн на полето (*Trialeurodes vaporariorum*) в доза 50 мл/дка;
- зелена прасковена листна въшка по пипер (*Myzodes persicae*) в доза 50 мл/дка;
- агрилус по маслодайна роза (*Agrilus cuprescens*) в доза 50 мл/дка;
- ясенов листов хоботник (*Stereonychus fraxini*) в доза 50 мл/дка;
- зелева нощенка по зеле (*Mamestra brassicae*) в доза 50-70 мл/дка;
- тютюнев трипс по тютюн (*Thrips tabaci*) в доза 50-80 мл/дка;
- неприятели по люцерната за семепроизводство - до началото на цъфтеж в доза 60 мл/дка;
- сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*) в доза 100 мл/дка;
- марокански (*Doclostaurus maroccanus*) и италиански скакалец (*Calliptamus italicus*) в доза 100 мл/дка;

-дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели - оризова гъгрица (*Sitophilus oryzae*), житна гъгрица (*Sitophilus granarius*), ръждиво-червен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), зърнов бръмбар (*Rhizoperta dominica*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*). Третиране с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026 в доза 3 мл+12 мл вода за 10 м³; третиране с тракторна пръскачка в доза 1 мл/м² площ с 0,5-1 л/м² раб. р-р. Експозиция 48 часа.

Категория на употреба:

Карантинен срок:

R фрази:

S фрази:

ЛАНАТ 25 ВП
метомил 250 г/кг

Производство на ф. “ДюПонт ИО” - Швейцария.

Срещу:

-листоминиращи мухи по зеленчуци (*Liriomyza brioniae*, *L. trifolii*, *L. huidobrensis*) в концентрация 0,08 %;

-кръгломиниращ молец (*Cemiosstoma scitella*) в концентрация 0,08 %;

-шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*) в концентрация 0,08 %;

-оранжерийна белокрылка по домати на открито (*Trialeurodes vaporariorum*) в концентрация 0,08 %;

-калифорнийски трипс по краставици на открито (*Francliniella occidentalis*) в концентрация 0,08 %;

-памукова листна въшка по зеленчуци - краставици на открито (*Aphis gossypii*) в концентрация 0,09 %;

-зелена прасковена листна въшка по зеленчуци - пипер на открито (*Myzodes persicae*) в концентрация 0,09 %;

-лукова муха (*Delia antiqua*) в доза 80 г/дка;

-листоминиращи мухи по праз (*Napomyza gymnostoma*) в доза 80 г/дка;

-тютюнев трипс по тютюн (*Thrips tabaci*) доза 90 г/дка;

-зелена прасковена листна въшка по тютюн (*Myzodes persicae*) доза 90 г/дка.

Категория на употреба: I.

Карантинен срок: ябълки, домати, краставици, чушки, тютюн, праз, лук - 7 дни; грозде - 14 дни.

R фрази: R 20; R 25; R 50/53; R 57.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 22; S 35; S 36/37; S 45; S 57; S 61.

ФОРЕЙ 48 Б
Бацилус турингиензис вар.
Курстаки - 10600
международни единици за 1
мг готов продукт

Производство на ф. “Валент Биосайънсис” - САЩ.

Срещу:

-шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*) в концентрация 0,15 %;

-зелена дъбова листозавивачка (*Tortrix viridana*) в доза 100 мл/дка за УЛВ;

-малка зимна педомерка (*Operophtera brumata*) в доза

100 мл/дка за УЛВ;
-борова процесия (*Thaumetopoea pityocampa*) в доза 100 мл/дка за УЛВ;
-златозадка по горски видове (*Euproctis chrysorrhoea*) в доза 150 мл/дка за УЛВ;
-гъботворка по горски видове (*Lymantria dispar*) - ларви I и II възраст в доза 300 мл/дка за УЛВ;
-гъботворка по горски видове (*Lymantria dispar*) - ларви над II възраст в доза 400 мл/дка за УЛВ.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R43.
S фрази: S 24; S 37.

Х Е Р Б И Ц И Д И

АРАМО 50

тепралоксидим - 50 г/л

Производство на ф. "БАСФ" - Германия.
Срещу едногодишни житни плевели при:
-слънчоглед, соя, фасул, грах, люцерна в доза 100 мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите.
Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:
-слънчоглед в доза 160 мл/дка и 15-20 л/дка раб. р-р, внесен при височина 20-30 см на балура; 15-20 см на пирей; 10-15 см на тряска;
-соя, фасул, грах, люцерна в доза 200 мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: соя, фасул, слънчоглед - 60 дни; грах - 35 дни.
R фрази: R 38; R 40; R 51/53; R 62; R 63; R 65 R 66.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; 36/37; S 57; S 62.

АУРА ПЛЮС

клефоксидим (профоксидим)
- 75 г/л+
метилолеат (масло) - 300 г/л

Производство на ф. "БАСФ" - Германия.
Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. кокоши проса при:
-ориз в доза 150-200 мл/дка, внесен във фаза 2-4 лист на културата, при източена вода.
Категория на употреба: III.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 38; R 43.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24.

БАЗИС 75 ДФ+ТРЕНД

римсулфурон - 500 г/кг+
тифенсулфурон - 250 г/кг+
Тренд 90 (прилепител)

Производство на ф. "ДюПонт ИО" - Швейцария.
Срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:
-царевица в доза 2-2,5 г/дка+0,1 %, внесени във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до

6-ти лист на културата.
Категория на употреба: Ш.
Карантинен срок: 30 дни.
R фрази: R 50/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 35; S 57; S 61.

ДЕЗОРМОН ЛИКИД
2,4 Д аминна сол - 600 г/л

Производство на ф. "Ню Фарм" - Австрия.
Срещу широколистни плевели при:
- **царевица** в доза 120 мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист на културата;
- **пшеница и ечемик** в доза 150-200 мл/дка, внесен във фаза братене на културите.
Категория на употреба: Ш.
Карантинен срок: 30 дни.
R фрази: R 22; R 24; R 34; R 41; R 43; R 51/53.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24; S 26; S 35; S 36/37/39.

ИГЪЛ 75 ДФ
хлорсулфурон - 750 г/кг

Производство на ф. "ДюПонт ИО" - Швейцария.
Срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:
- **пшеница и ечемик** в доза 1,5 г/дка, внесен след 3-ти лист на културите.
Срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди и някои житни (див овес, лисича опашка) плевели при:
- **пшеница** в доза 2-2,5 г/дка, внесен след сеитба, преди поникване на културата.
Забележка: Да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на пшеница.
Категория на употреба: Ш.
Карантинен срок: 60 дни.
R фрази: R 50/53.
S фрази: S 2; S 13; S 21/22; S 35; S 57; S 61.

КОТОЛИНТ 500 СК
флуометурон - 500 г/л

Производство на ф. "Ню Фарм" - Австрия.
Срещу едногодишни широколистни плевели при:
- **памук** в доза, внесен след сеитба, преди поникване.
Категория на употреба: Ш.
Карантинен срок: не се изисква.
R фрази: R 22.
S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24/25; S 36/37/39; S 46.

ТИТУС ПЛЮС ВГ+ ТРЕНД
римсулфурон - 3,26 % +
дикамба - 60,87 %)+
Тренд 90 (прилепител)

Производство на ф. "ДюПонт ИО" - Швейцария.
Срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:
- **царевица** в доза 30,7 г/дка+0,1 %, внесен във фаза 2-6 лист на културата.
Категория на употреба: Ш.
Карантинен срок: 30 дни.
R фрази: R 41.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 26; S35; S 36/37; S 39; S 57.

ФОКУС УЛТРА
циклоксидим 100 г/л+тензид

Производство на ф. “БАСФ” - Германия.

Срещу едногодишни житни плевели при:

-слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна в доза 100 мл/дка.

Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

-слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна в доза 200 мл/дка.

Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

Категория на употреба: за свободна употреба.

Карантинен срок: 60 дни.

R фрази: R 38; R 52/53; R 65; R 67.

S фрази: S 2; S 13; S 20/21; S 24/25; S 46; S 62.

Изпълнението на заповедта възлагам на Генералния директор на Национална служба за растителна защита.

МИНИСТЪР:

/ НИХАТ КАБИЛ /