

Продукт за растителна защита

Преди употреба прочетете внимателно етикета и придружаващите указания

ЕКЛИПС 70 ВГ

Хербицид



ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност: H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ЕУН 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. **P501** Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Допълнително етикиране: SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

Съдържание на активното вещество: 700 г/кг метрибузин.

Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ).

Функция на продукта: Хербицид.

Разрешен за употреба в Р България със Заповед № РД 11-770/ 10.05.2016г. и Заповед № РД 11-1234/ 07.07.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01095-ПРЗ/ 3-25.07.2016г.

Категория на употреба: Втора професионална.

Производител на продукта: ADAMA AGAN Ltd.

Притежател на разрешението: Adama Agriculture BV., Arnhemseweg 87, 3832 Leusden, Netherlands.

Механизъм на действие: Еклипс 70 ВГ се поема от растенията, както чрез корените, така и чрез листата като блокира растежа на плевелите.

Област на прилагане на продукта: За условията на Република България, Еклипс 70 ВГ е разрешен за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при следните култури:

При картофи – в доза 25-40 г продукт/дка, приложен преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или в доза 25-30 г продукт/дка, приложен след поникване на културата (след ВВСН 10 – след фаза „първите листенца започват да нарастват“ (от клубени) и след фаза „котиледоните напълно се разтварят“ (от семена), при височина на стъблото 5-10 см. Прилагайте по-ниската доза за леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключвате песъчливите почви. **Количество вода:** 20-50 л/дка. **Карантинен срок:** Не се изисква, тъй като се покрива от периода на развитие на културата.

Забележка: Продуктът е напълно поносим от следните сортове картофи: Admiranus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

При домати – в доза 25-30 г продукт/дка приложен преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или в доза 25-40 г продукт/дка приложен след поникване на културата (след фенофаза „пълно развитие на котиледоните“ (след ВВСН 10). Към момента на третирането, растенията трябва да са развили поне 8-9 листа (ВВСН 18-19). Оптималната фаза за третиране на културата – „първа цветна китка“. Прилагайте по-ниската доза за леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключите песъчливи почви. **Количество вода:** 20-50 л/дка. **Карантинен срок:** 30 дни.

При моркови – приложен в доза 25-35 г продукт/дка, приложен след фенофаза „разтворен 4 същински лист“ (след ВВСН 14). **Количество вода:** 20-50 л/дка. **Карантинен срок:** 60 дни.

При соя – приложен в доза 25-35 г продукт/дка, приложен след сеитба, преди поникване на културата. Не използвайте на много леки или торфени почви. **Количество вода:** 20-50 л/дка. **Карантинен срок:** Не се изисква, тъй като се покрива от периода на развитие на културата.

При люцерна – приложен в доза 50-75 г продукт/дка. Прилага се през есента след последният откос, когато културата е във вегетационен покой. Прилагайте ниската доза на леки почви, а високата доза на средно текстурирани, тежки и много тежки почви. **Количество вода:** 20-50 л/дка. **Карантинен срок:** 60 дни.

При мека и твърда пшеница и ечемик – приложен в доза 10г продукт/дка след поникването на културата през фенофази на развитие – от „2 листа разтворени“ до „край на братене“ (ВВСН 12-29). **Количество вода:** 40 л/дка. **Карантинен срок:** Не се изисква, тъй като се покрива от периода на развитие на културата.

Максимален брой приложения за сезон: 1 за всички употреби

Техника на приложение за всички употреби: механизизирана наземна техника. Да не се прилага с ръчна пръскачка.

Прилага се за контрол на следните плевели: *Alopecurus myosuroides* (лисича опашка), *Amaranthus spp.* (видове щир), *Anagallis arvensis* (полско огнивче), *Atriplex patula* (разстлана лобода), *Capsella bursa-pastoris* (овчарска торбичка), *Centaurea cyanus* (синя метличина), *Chenopodium album* (бяла

куча лобода), *Chenopodium spp.* (видове лобода), *Digitaria sanguinalis* (кръвно просо), *Fumaria spp.* (видове росопас), *Geranium spp.* (видове здравец), *Lamium spp.* (видове мъртва коприва), *Lolium spp.* (видове райграс), *Matricaria chamomilla* (лайка), *Mercurialis annua* (едногодишен пролез), *Panicum spp.* (видове диво просо), *Poa annua* (едногодишна метличина), *Polygonum spp.* (видове пиперче), *Portulaca oleracea* (тученица), *Raphanus raphanistrum* (дива ряпа), *Senecio vulgaris* (обикновен спореж), *Sinapsi arvensis* (див синап), *Sonchus oleraceus* (градински кострец), *Spergula arvensis* (полска колянка), *Stellaria media* (врабчови чревца), *Thlaspi spp.* (видове попова лъжичка), *Urtica dioica* (коприва), *Veronica spp.* (великденче) и др.

Фитотоксичност: Не третирайте домати в оранжерии или тунели. Не третирайте на много леки почви. Не третирайте преди засаждането на домати в следните случаи:

1. Ако се използва по-малко количество семена от 250 г семена/дка, тъй като културата ще бъде по-чувствителна при трайни понижения на температурата;
2. При т.нар. „бели почви“, които образуват кора към момента на поникване на растенията. За третиранията преди поникването или след пресаждането се придържайте към следните мерки: ако се наложи напояване по време на прилагането на продукта, го направете поне 6-7 дни преди третирането; не третирайте култури подложени на стрес (засушаване, високи или ниски температури, преовлажняване и др.); ако е необходима почвена обработка, за да не се засегнат корените на домати, тя следва да е на повърхността и да се извърши 5-10 дни преди третирането.

Действие на продукта върху следващите в сеитбооборота култури: При регистрираните дози не са забелязани негативни въздействия. Не третирайте сортове картофи Draga, Jarla и Vivax, тъй като е установена чувствителност към продукта.

Внимание: Да се използва единствено и само за употребите и при условията посочени в този етикет. Лицето използващо продукта е отговорно за евентуалните щети причинени от неправилната употреба на продукта. Спазването на всички предписания съдържащи се в настоящия етикет е важно условие за осигуряване ефикасността на третирането и за избягване на щети при растенията, хората и животните.

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие: Не прилагайте чрез въздушно пръскане. Прилагайте при липса на вятър. Да не се продава в насипно състояние.

Управление на резистентността: За да се избегне формирането на резистентни биотипове плевели към хербицида се препоръчват следните мероприятия: Да не се извършва последователно третиране с продукти от една и съща хербицидна група. Да се редува Еклипс 70 ВГ с регистрирани продукти от други хербицидни групи. Да се прилагат интегрирани методи за контрол на плевелите. Ротацията на културите, редуването на хербициди с различен механизъм на действие или прилагането им в смеси са от съществено значение за контрол на плевели, устойчиви към хербициди.

Съвместимост: По отношение на съвместимостта, обръщайте се към специалистите на АДАМА АГАН Лтд/ АДАМА Агрикълчър Б.В., Нидерландия/ „Агрибул“ ЕООД.

Внимание: При смесване с други продукти трябва да се спазва по-дългия карантинен срок. Трябва да се спазват предпазните мерки предписани за най-токсичният продукт. Ако настъпят случаи на отравяне, информирайте лекаря за направената смес.

Приготвяне на работния разтвор: Към измереното количество вода се добавя Еклипс 70 ВГ при непрекъснато разбъркване.

Мерки при инцидентно разливане: Осигурете достъпа на чист въздух. Избягвайте вдишване и контакт с кожата и очите. Да се предотврати инфилтрацията в подпочвените води и проникване в почвата. Да се предотврати изтичане на продукта в канализацията. При инцидентно попадане в канализацията да се уведомят съответните отговорни власти (РИОСВ- Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите).

Подходящи пожарогасителни средства: Вода.

Първа помощ и медицински съвети: ***При вдишване:*** Преместете пострадалият от зоната на инцидента. Осигурете чист въздух и незабавно потърсете лекарска помощ. ***При контакт с кожата:*** Измийте незабавно и обилно със сапун с вода. Отстранете замърсените дрехи. Консултирайте се с лекар, ако се появят симптоми (дразнене). ***При контакт с очите:*** Незабавно промийте с много вода. Премахнете контактните лещи и продължете да промивате с много вода в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете лекарска помощ и носете този информационен лист за безопасност. ***При поглъщане:*** Изпийте голямо количество вода. Потърсете незабавно лекарска помощ и носете етикета/ информационен лист за безопасност на продукта.

Указания към лекаря: Да се третира симптоматично.

При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, Клиника по токсикология тел.02/91 54 409, e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg; www.pirogov.bg

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Унищожаване на празните опаковки: Остатъци от продукта и работния разтвор да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми. Да се спазват местните разпоредби. Преди да се изхвърли на определеното за целта място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (чрез деформиране, пробиване и др.). Рециклирайте опаковките съгласно действащото законодателство. Напълно изпразнената опаковка да не се изхвърля в околната среда. Опаковката не може да се използва повторно.

Условия на съхранение: В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продукти за растителна защита: далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални плътно затворени опаковки. Не допускате складиране на продуктите при

температури под 0 °C и над 35 °C. Не складирайте опаковките/ палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания.

Транспорт: Да се спазват изискванията за транспорт на продукти за растителна защита спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

