



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *РДМ-985*

София, ... *10.06.* 2015 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ, бр. 61 от 2014 г.), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 6928/29.04.2015 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 9552/22.05.2014 г. на фирма Синджента България ЕООД, София.

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: ЧЕРОКИ СЕ
Активно вещество: Хлороталонил 375 г/л
Ципроконазол 50 г/л
Пропиконазол 62,5 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън Монтей, Швейцария

Производител на активното вещество хлороталонил: Синджента Кроп Протекшън АГ

Производител на активното вещество ципроконазол: Синджента Кроп Протекшън АГ

Производител на активното вещество пропиконазол: Синджента Кроп Протекшън АГ

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспо-емулсия (СЕ)

Категория на употреба: I професионална

Размер и материал на опаковката: 5 л, 10 л и 20 л бутилка (HDPE)

Срок на годност: 2 години

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяването чрез отточните канали на ферми или пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води/ неземеделски земи с цел опазване на водните организми/ членестоногите, които не са обект на третиране.
- С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този продукт или всеки друг продукт, съдържащ хлороталонил, в годишна доза над 75 гр. а.в./дка при единично приложение. При многократно приложение да не се прилага в обща годишна доза, надвишаваща 125 гр. а.в./дка, като не се надвишава доза от 50 гр. а.в./дка при приложение от етапи ВВСН 31-39 и 75 гр. а.в./дка при приложение от етап ВВСН 39.
- Да не се прилага с ръчна пръскачка.
- Срок за повторно влизане в третираните площи – 48 часа.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукт а	Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Каран- тинен срок (дни)	Забе- лежки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (i)	Брой макс (k)	Интер- вал м/у прило- женията (мин)	Мл продукт /дка Мин - макс	Вода л/дка мин-макс	Гр. а.в./ дка		
ЧЕРОКИ СЕ	Пшеница	П	Черна стъблена ръжда (<i>Puccinia graminis</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Септориоза (<i>Septoria spp</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	* 375 г/л ** 50 г/л *** 62,5 г/л	СЕ	Листно приложе- ние/ механизир ана наземна техника	От ВВСН 31 -65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене- пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	200 мл/дка	10-50 л/дка	*75 ** 10 *** 12,5	49	(m)
							I третиране в ВВСН 31 - 39 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -флаговият лист е напълно разт- ворен, лигулата е едва видима)	2	Съоб- разно фазите на прило- жение	1) 133 мл/дка 2)200 мл/дка		1) *49,9 ** 6,75 *** 8,31 2) *75 ** 10 *** 12,5		
							II третиране ВВСН 39 – 65 (флаговият лист е напълно разт- ворен, лигулата е едва видима							
							– пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)							

ЧЕРОКИ СЕ	Ечемик	П	Хелминто- спориоза (<i>D. Teres</i>) Листна ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) Листен пригор (<i>Rhinchosporim spp.</i>) Рамулария (<i>Ramularia spp.</i>)	* 375 г/л ** 50 г/л *** 62,5 г/л	СЕ	Листно приложение/механизир ана наземна техника	От ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене-край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)	1	-	200 мл/дка	10-50 л/дка	42	*75 ** 10 *** 12,5
							1) ВВСН 31- 39 (първия възел е поне 1 см над възела на братене –флаговият лист е напълно разтворен, лигулата едва видима) 2) ВВСН 39 – 59 (фаза 39 – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)	2	Съоб-разно фазите на приложени	1) 133 мл/дка 2) 200 мл/дка			1) *49,9 ** 6,75 *** 8 2) *75 ** 10 *** 12,5

ЧЕРОКИ СЕ	Ръж	П	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	* 375 г/л ** 50 г/л *** 62,5 г/л	СЕ	Листно приложение/механизирана наземна техника	1) ВВСН 31-39 (първия възел е поне 1 см над възела на братене – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) 2) ВВСН 39 – 65 (фаза 39 – пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	200 мл/дка	10-50 л/дка	*75 ** 10 *** 12,5	49	
ЧЕРОКИ СЕ	Тритикале	П	Черна стъблена ръжда (<i>Puccinia graminis</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	* 375 г/л ** 50 г/л *** 62,5 г/л	СЕ	Листно приложение/механизирана наземна техника	От ВВСН 31-65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене – пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	200 мл/дка	10-50 л/дка	*75 ** 10 *** 12,5	49	

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация

Xn – Вреден
N – Опасен за околната среда
R фрази: R20, R36/37, R40, R43, R50/53, R63

Етикетиране

Xn – Вреден
N – Опасен за околната среда
R фрази: R20, R36/37, R40, R43, R50/53, R63
S фрази: S2, S13, S20/21, S35, S36/37, S57

Специфични предпазни мерки за безопасност

SP фрази: SP1, SPe1, SPe3

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите и сигнални думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, кат.1	H317	GN07	H317	EUN401	SP1, SPe1, SPe3
Дразнене на очите, кат.2	H319	GN08	H319		
Остра токсичност инхалационна, кат.4	H332	GN09	H332		
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, кат.3	H335	Внимание	H335		
Канцерогенност, кат.2	H351		H351		
Токсичност за репродукцията, кат.2	H361d		H361d		
Силно токсичен за водните организми	H400		H410		
Остра опасност, категория 1					
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект, Хронична опасност, категория 1	H410				

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество пропиконазол, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009г., а именно до 31.01.2018 г.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара на продукта на Синджента България ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

