

ЗАПОВЕД

№ РДН-416

София, ...10.03..... 2015 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ, бр. 61 от 2014 г.), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 2603/2015 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 951/20.01.2015 г. на фирма БАСФ СЕ, Германия,

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: КОРУМ

Активно вещество: Имазамокс – 22,4 г/л
Бентазон – 480 г/л

Производител на продукта за растителна защита – БАСФ СЕ, Германия

Производител на активните вещества: имазамокс и бентазон – БАСФ СЕ., Германия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л и 10 л бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE)

Срок на годност: 2 години

Забележки:

- Да не се прилага с ръчна пръскачка.

- Срок на засяване на други култури след приложение на продукта – минимум 6 месеца за захарно цвекло и рапица и минимум 4 месеца за сортове пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеле, домати и картофи, които не са резистентни на имидазолинови хербициди.
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна растително защитна ивица от 5 метра при соя, в случай на прилагане на пълната доза без адювант ДЕШ ХЦ (DASH HC).
- Срок на засяване на други култури след приложение на продукта – минимум 6 месеца за захарно цвекло и рапица и минимум 4 месеца за сортове пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеле, домати и картофи, не резистентни на имидазолинови хербициди.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О и/или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение					Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Мл/дка Мин/ макс	Вода литра/ дка	Грама а.в./дка			
КОРУМ	Фасул (обикновен и градински)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	*22,4 г/л ** 480 г/л	СЛ	Приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда)	1	-	125 мл/дка	20-30	* 2,8 г/дка ** 60 г/дка	35	Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%	Двукратно приложение в зависимост от условията на околната среда
							ВВСН 12-25 (непосредствено преди 2 развити листа – 5-то странично разклонение се вижда)	2	7-14 дни	62,5 + 62,5 мл/дка		* 1,4 + 1,4 г/дка ** 30 + 30 г/дка			

КОРУМ	Обикновен грах Фуражен грах (зимни и пролетни форми)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	* 22,4 г/л ** 480 г/л	СЛ	Приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)	1	-	125 мл/дка	20-30	* 2,8 г/дка ** 60 г/дка	35	Да се използва в комбинация с адованта ДЕСН ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3% Двукратно приложение в зависимост от условията на околната среда
							ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)					* 1,4 + * 1,4 г/дка ** 30 + ** 30 г/дка		
КОРУМ	Соя	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	* 22,4 г/л ** 480 г/л	СЛ	Приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 12-25 (разтваря се трилистник на 2-ри възел – 5-то странично разклонение от първи порядък)	1	-	190 мл/дка	20-30	* 4,26 г/дка ** 90 г/дка	60	Да се използва в комбинация с адованта ДЕСН ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3% Двукратно приложение в зависимост от условията на околната среда
							ВВСН 11-25 (непосредствено преди разтваряне на първата двойка същински листа - 5-то странично разклонение от първи порядък)					* 2,1 + * 2,1 г/дка ** 45,6 + ** 45,6 г/дка		

КОРУМ	Стара люцерна	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	* 22,4 г/л ** 480 г/л	СЛ	Приложение с конвенционална наземна техника	При височина на културата 5-6 см	1	-	125 мл/дка	20-30	* 2,8 г/дка ** 60 г/дка	40	Да се използва в комбинация с адованта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%
						Първо третиране – непосредствено преди височина на културата 4-5 см	2	7-14	62,5 + 62,5 мл/дка			* 1,4 + * 1,4 г/дка ** 30 + ** 30 г/дка		Двукратно приложение в зависимост от условията на околната среда

* Имазамокс
** Бентазон

- (а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (д) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (е) GCRF Кодове – GIGAP Техническа монография №2, 1989
- (ф) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени
- (г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (и) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BBCN Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (л) РНН – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (м) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Етикетиране	Специфични предпазни мерки за безопасност
Xn – Вреден	Xn – Вреден	SP фрази: SP1, SPe3
R фрази: R22, R52/53	R фрази: R22, R52/53	
	S фрази: S2, S13, S20/21, S29 S36/37, S46, S57	

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите на сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2016 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

