СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ ...РД11-1761

София, ...10.11..... **2014 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (*обн. ДВ, бр. 61 от 2014 г.*), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 17961/17.10.2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2493/07.02.2014 г. от фирма „Де Сангос СА", Франция,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: ЛИМАТАК

Активно вещество: Металдехид – 40 г/кг

Производител на продукта за растителна защита – „Де Сангос СА", Франция

Функция на продукта за растителна защита: лимацид

Вид на формулацията: гранулирана примамка (ГБ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката:

- HDPE – полиетилен висока плътност – кофа – 3,5-5,0 кг;
- Картонени кутии от 0.2-1.5 кг.
- Многослойна хартиена торба – 5,0-25,0 кг;
- Тъкана полипропиленова чанта/торбичка – 200-1000 кг.

Срок на годност: 2 години. Да не се съхранява при температура над 35^0C.

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяването чрез отточни канали на ферми или пътища);
- Да се отстраняват разпилените количества с цел опазване на дивите птици и дивите бозайници.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
Лиматак	(a)	(b)	(c)	Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	**Макс. доза продукт /дка**	Вода L/дка Мин// макс	гр. а.в./дка	(l)	(m)
	Ягоди	П, О	Голи и градински охлюви			Площно (разхвърляне) или редово приложение	BBCH 00[1] - **не по-късно от BBCH 69 – – край на цъфтежа**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение

Лиматак	Цитрусови култури, черупкови овошни видове	П		40 г/кг	ГБ	Площно (разхвърляне) или редово приложение	ВВСН 00[1] – **не по-късно от ВВСН 69 – – край на цъфтежа**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
	Семкови и костилкови и овощни видове	П	Голи и градински охлюви				ВВСН 00[1] – **не по-късно от ВВСН 69 – – край на цъфтежа**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
	Лозя – винени и десертни, ягодоплодни култури – къпини, малини, боровинки, касис	П					ВВСН 00[1] – **не по-късно от ВВСН 69 – – край на цъфтежа**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение

	Картофи	П				Площно (разхвърляне) приложение	BBCH 00[1]- BBCH 97 листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и загиват	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	7дни	
Лиматак	Захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кръмно цвекло, ряпа	П	Голи и градински охлюви	40 г/кг	ГБ	Браздово или площно (разхвърляне) приложение	BBCH 00[1] – **не по-късно от BBCH 15 разлистени 5 листа**	1-4	5 дни	Браздово - при засаждане в доза – 400 г/дка, площно - 500 г/дка	-	16 г. металдехид/дка , 20 г.метилдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
	Карфиол, броколи, главесто зеле, брюкселско зеле	П				Площно приложение (разхвърляне)	BBCH 00[1] – **не по-късно от BBCH 41 – начало на формиране на главите – двата най-млади листа не са разтворени**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение

	Марули и други салати, спанак и подобни, подправки – магданоз	П, О	Голи и градински охлюви	40 г/кг	ГБ	Площно приложение (разхвърляне)	BBCH 00[1] – **не по-късно от BBCH 41 – начало на формиране на главите – двата най-млади листа не са разтворени – за марули, салати / образувана 10% от листната маса характерна за вариетета – за спанак, магданоз и други подправки**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
Лиматак	Грах, фасул, леща	П				Площно приложение (разхвърляне)	BBCH 00[1] – **не по-късно от BBCH 15 пети същински лист разтворен**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение

	Артишок	П	Голи и градински охлюви	40 г/кг	ГБ	Площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00[1] **не по-късно от ВВСН 51 видими цветни пъпки**	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
	Маслодайни култури с изключение на фъстъци	П				Браздово, смесване със семената, площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00 ВВСН 00[1] - **не по-късно от ВВСН 17 – разтворен седми лист**	1-4	5 дни	Браздово приложение при сеитба или смесване със семената в доза– 400 г/дка; при площно приложение – 500 г/дка	-	16 г. металдехид/дка , 20 г.метилдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение

Лиматак	Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале	П	Голи и градински охлюви	40 г/кг	ГБ	Смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00 ВВСН 00[1] – **не по-късно от ВВСН 29 – край на братене**	1-4	5 дни	При смесване със семената – 400 г/дка; при площно прилложение – 500 г/дка	-	16 г. металдехид/дка , 20 г.метилдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
	Царевица, сладка царевица	П				Браздово, площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00 **ВВСН 00[1]- не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа**	1-4	5 дни	Браздово - при засаждане в доза – 400 г/дка, площно - 500 г/дка	-	16 г. металдехид/дка , 20 г.метилдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение
	Просо, сорго	П				Браздово, площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00 **ВВСН 00[1] - не по-късно от ВВСН 15-разлистени 5 листа**	1-4	5 дни	Браздово - при засаждане в доза – 400 г/дка, площно - 500 г/дка	-	16 г. металдехид/дка , 20 г.метилдехид/дка	-	Карантинният срок се определя от последното приложение

Лиматак	Ново пасище (райграс)	П	Голи и градински охлюви	40 г/кг	ГБ	Смесен със семената и/или площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00[1] - ВВСН 15 разлистени 5 листа	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г.метилдехид/дка	49 дни	В третираните площи да се пускат животни за паша не по-рано от 49 дни след приложението на продукта.
	Тревни площи	П				Смесен със семената и/или площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00 ВВСН 00[1] – ВВСН 99	1-4	5 дни	При смесване със семената – 400 г/дка; при площно приложение – 500 г/дка	-	16 г. металдехид/дка , 20 г.метилдехид/дка	-	-
	Цветя и декоративни култури	П, О				Площно приложение (разхвърляне)	ВВСН 00[1] – ВВСН 99	1-4	5 дни	500 г/дка	-	20 г металдехид/дка	-	-

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или на закрито (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Забележки:

- **BBCH 00[1] – приложение 7 дни преди сеитба/засаждане.**
- **Максималната обща доза, с включени всички приложения, не трябва да надвишава 1,75 кг. продукт/дка за култура/вегетационен период (70 г. металдехид/дка).**
- **Продуктът се прилага механизирано или ръчно.**

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	***Етикетиране***	
		Специфични предпазни мерки за безопасност
	S фрази: : S1/2, S13, S20/21, S36/37, S46, S49	SP фрази: SP1, SPe6

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		***Етикетиране***			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	***Код на предупреждението на опасност***	***Кодове на пиктограмите иа сигналните думи***	***Код (ове) на предупреждението за опасност***	***Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност***	***Специфични предпазни мерки за безопасност***

I. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата, на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) №1107/2009, а именно до 31.05.2022 г.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на фирма „Де Сангос СА", Франция.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПГ/КАПРЗ/РЗК/БАБХ