



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *PD11-1559*

София, *29-08*..... 2016 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-858/11.08.2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15564/13.10.2015 г. на Адама Агрикълчър БВ, упълномощен представител Агрибул ООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговскоиме на продукта: КУСТОДИЯ

Активно вещество: Азоксистробин 120 г/л

Тебуконазол 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Адама Мактешим Лтд, Израел

Производител на активното вещество азоксистробин: Синджента Сърплай АГ, Швейцария

Производител на активното вещество тебуконазол: АДАМА Ирвита Н.В., Кюрасао

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка и туба от HDPE, HDHMPPE и PE/PA


Забележки:

- Да се носят лични предпазни средства по време на всички етапи на работа с продукта.
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да не се прилага чрез въздушно пръскане.
- Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от: 5 метра - за пролетни зърнено-житни култури - върху почви с наклон до 4% и 10 метра - за почви с наклон над 4%; 10 метра за зимни зърнено-житни култури - върху почви с наклон под 4% и 20 метра - за почви с наклон над 4% до повърхностните води, с цел опазване на водните организми.

- Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра при лозя, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етикетираните на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество тебуконазол, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.08.2020 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.
 5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикълчър БВ.
 6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
 7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПГ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 22/11-1559/29.08.2016г.,

Име на продукта: Кустодия
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активното вещество: азоксистробин - 120 г/л
 Концентрация на активното вещество: тебуконазол – 200 г/л

Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
			Метод/Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложени-ята, дни (мин)	Мл. продукт/дка	Вода литра/ дка Мин макс	Гр.ав./ дка		
(a)	(b)	(c)								(l)	(m)
Ечемик (зимен и пролетен)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> spp.) Ръжда (<i>Puccinia</i> spp.) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 30 - 59 Начало на удължаване на стъблото до край на изкласяването	2	14 - 21	100-125 мл/дка	10-50	Азоксистробин 12-15 г/дка Тебуконазол 20-25 г/дка	35	
		Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> spp.) Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> spp.) Ръжда (<i>Puccinia</i> spp.) Листни петна (<i>Septoria</i> spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 30 - 69 Начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа	2	14 - 21	100-125 мл/дка	10-50	Азоксистробин 12-15 г/дка Тебуконазол 20-25 г/дка	35	
Пшеница Тритикале	П										

Лозя (винени сортове)	П	Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20 – 75 Десет и повече листа са отворени до гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват	2	10-14	75 мл/дка	50-100	Азоксистробин 9 г/дка Тебуконазол 15 г/дка	21	
Краставици Тиквички	О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 14 – 89 Четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен до пълна зрялост	3	10-14	50-100 мл/дка	50-100	Азоксистробин 6-12 г/дка Тебуконазол 10-20 г/дка	3	
Пъпеш	О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 14 – 89 Четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен до пълна зрялост	3	10-14	50-100 мл/дка	50-100	Азоксистробин 6-12 г/дка Тебуконазол 10-20 г/дка	7	
Лук Чесън	О	Ръжда (<i>Rhizinia spp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13 -89 Трети лист (>3 см) ясно видим до пълно узряване	2	10-14	50-100 мл/дка	50-100	Азоксистробин 6-12 г/дка Тебуконазол 10-20 г/дка	21	

Домати Патладжан	О	Брашеста мана (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidiopsis taurica</i>)	Конвенцио- нална наземна техника	BVCH 14 – 89 Четвърти същински лист до пълна зрялост	3	10-14	50-100 мл/дка	50-100	Азоксис- тробин 6-12 г/дка Тебуконазол 10-20 г/дка	3	
Пипер	О	Брашеста мана (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidiopsis taurica</i>)	Конвенцио- нална наземна техника	BVCH 14 – 89 Четвърти същински лист до пълна зрялост	2	10-14	50-100 мл/дка	50-100	Азоксис- тробин 6-12 г/дка Тебуконазол 10-20 г/дка	3	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/гризещи или смучещинасекоми, почвениянасекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GSPFКодове – GIFAРТехническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушнопръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален интервал приложения приложението съгласно практическите условия на употреба

(l) PHI – минимален интервал предприбиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност – орална, категория 4	H302 H361d	GHS07 GHS08	H302 H316d	EUN401 EUN 208 „Съдържа 1,2	SP Фрази: SP1, SPe3
Репродуктивна токсичност, категория 2	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	бензисотиазолинон-3-он. Може да причини алергична реакция”.	
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1					