

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р

ГРУПА 27 | P 07 | M 01 | ФУНГИЦИДИ



Внимание

UFI: 0CX1-HD7N-W40J-94AK

Предупреждения за опасност

- H317 Може да причини алергична кожна реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P391 Съберете разлятото.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионални/ национални/ международни разпоредби

Специфични предпазни мерки за безопасност

- EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: симоксанил 28.5 г/кг + фозетил-алуминий 300 г/кг + меден оксихлорид 281 г/кг (чиста мед 160 г/кг) **Химическо наименование на а.в. (IUPAC):**

симоксанил: 2-циано-N-[(етиламино) карбонил]-2-(метоксиамино)ацетамид;
фозетилалуминий: етил водороден фосфонат, алуминиева сол; меден оксихлорид: димеден
хлорид трихидроксид

Химична група: комбинация от алифатен азотен + органофосфорен + меден фунгициди

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: вододиспергируеми гранули ВГ

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед № РД 11-413/10.03.2015 г. и Заповед № РД 11-1344/19.05.2026 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употребата на ПРЗ № 1308-ПРЗ-1/08.04.2015 г.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална

КАРАНТИНЕН СРОК: лозя - 40 дни; картофи, домати – 20 дни, марули, салати, спанак – 15 дни.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Витене Трипло Р е фунгицид за контрол на мана по лоза, домати и картофи и други зеленчукови култури, представляващ комбинация от три активни вещества с различен начин на действие: симоксанил с контактно и локално-системно действие, фозетил-алуминий със системно действие и меден оксихлорид с контактно действие. Комбинацията от трите различни начина на действие осигуряват силно и продължително действие на продукта. Витене Трипло Р е фунгицид с предпазно и лечено действие, блокиращ спорулацията и растежа на мицела на гъбния патоген.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Култура	Болест	Доза	Момент на приложение	Работен разтвор/дка
лозя	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	400-450 г/дка	ВВСН 11-79 (от отваряне на първи лист до затваряне на грозда)	40-100 л вода / дка
картофи	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)	400-450 г/дка	ВВСН 11-69 (от разтваряне на първи лист на главното стъбло до край на цъфтежа на първото съцветие)	60-80 л вода / дка
домати	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Алтернария (<i>Alternaria solani</i>)	400-450 г/дка	ВВСН 11-81 (от разтваряне на първи лист на основното стъбло до 10% от плодовете с типичен цвят на зреене)	60-80 л вода / дка
Маруля, кърдрволистна и широколистна ендивия, (салата Ескариол) и други салати	Мана по салатата (<i>Bremia lactucae</i>)	400-450 г/дка	ВВСН 11-48 (от разтворен първи същински лист до образуване 80% от листната маса, характерна за сорта)	60-80 л вода / дка

спанак	Мана (<i>Peronospora farinose</i>)	400-450 г/дка	ВВСН 11-48 (от разтворен първи същински лист до образувана 80% от листната маса, характерна за сорта)	60-80 л вода / дка
--------	---	------------------	---	--------------------

Максимален брой приложения за сезон: 4, за спанак - 2 Минимален интервал между третиранията: 10 дни

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

- **Лозя:** Първо приложение от ВВСН 11 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста). Третиранията се повтарят през интервал от 10 дни. Могат да бъдат направени максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата ВВСН 79 (повечето от зърната се събират, грозда се затваря).
По време на цъфтеж, продуктът да се прилага много внимателно за да се избегнат проблеми със селективността. При сортове с повишена чувствителност на листата (например Мускат) приложенията да се ограничат до максимум 3 за сезон и да се избягва приложението при млади насаждения (до 3 годишни) от такива сортове.
- **Картофи:** първо приложение от ВВСН 11 (разтваряне на първи лист на главното стъбло /> 4 см/). Максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата ВВСН 69 (край на цъфтежа на първото съцветие).
- **Домати:** първо приложение от ВВСН 11 (първи същински лист на основното стъбло е напълно разтворен. Третиранията се повтарят през 10 дни. Максимум 4 приложения за сезон, които да приключат във фаза на културата ВВСН 81: 10% от плодовете с типичен цвят на зреене.
- **Марули, салати, спанак:** първо приложение от ВВСН 11 (разтворен първи същински лист) до ВВСН 48 (образувана 80% от листната маса, характерна за сорта). Поради наличието на чувствителни сортове, препоръчително е да се направи предварителен тест за селективност на малка площ.

Третиранията трябва да започнат в ранни фази на развитие на културата, когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта или по сигнал от пунктовете за прогноза и сигнализация.

Приложенията се повтарят през интервал от 10-12 дни в зависимост от разпространението на болестта и наличието на условия, благоприятни за инфекция.

Минималната доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, да се прилага максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Напълнете резервоара на пръскачката с 3/4 от водата предвидена за третирането и включете бъркалката. Добавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода. Продължете разбъркването и по време на приложението, до изпръскване на целия разтвор.

СМЕСИМОСТ:

Да не се смесва с минерални масла и други маслени формулации, и листни азотни торове. В случай на смесване с листни торове да се направи предварителен тест върху малък участък, за да се провери съвместимостта.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Прилагайте продукта при отсъствие на вятър. Да не се внася чрез въздушно приложение.

УКАЗАНИЯ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: Няма ограничения по отношение на следващите в сеитбообръщението култури.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

Обща информация: Симптоми на отравяне може да се проявят след няколко часа; поради това да се осигури медицинско наблюдение за 48 часа след инцидент.

След вдишване: Осигурете чист въздух и се консултирайте с лекар при наличие на симптоми.

След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно.

След контакт с очите: Изплакнете очите, като държите клепачите отворени, с течаща вода за няколко минути. Консултирайте се с лекар, ако дразненето продължава.

След поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Незабавно се свържете с лекар.

Полезни за лекаря указания: Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

Да се предотврати формирането на прах. Да се осигури добра вентилация/изсмукване на праха на работното място.

При дейности довеждащи до формиране на прах, да се носи дихателен апарат с филтър. Да се носят гумени ръкавици, плътно прилепващи предпазни очила и подходящи предпазни дрехи. Работните дрехи да се изперат преди повторна употреба. Да се работи далеч от източници на запалване. Да не се пуши. При почивка и след приключване на работа да се измият ръцете. По време на работа да не се яде и пие.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Витене Трипло Р е силно токсичен за водните организми. Да не се допуска попадане на продукт в канализацията, повърхностни или подпочвени води.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ):

Разлетия продукт да се посипе с абсорбиращи материали (пясък, пръст или дървени стърготини) и да се събере в отделен контейнер за по-късно унищожаване. Да се предотврати попадане в канализацията, подпочвени или открити води. В случай на попадане на продукт във водни басейни или канализацията, информирайте компетентните органи.

Условия на съхранение: Да се съхранява в оригинални, плътно затворени опаковки, в сухи, хладни и добре вентилирани помещения, далеч от източници на топлина и директна слънчева светлина. Да се пази от достъп на деца. Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

Подходящи средства за гасене на пожар: CO₂, огнегасителен прах или водна струя под налягане. Гасете големи пожари с водна струя под налягане.

Предпазна екипировка за пожарникарите: Да се носи въздушен дихателен апарат.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ/ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:

Да не се замърсява околната среда с отпадъци/остатъци от продукта. Този продукт и празните опаковки трябва да се унищожават като опасен отпадък. Да се спазват всички местни и национални разпоредби свързани с опазване здравето на хората и околната среда.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

Срок на годност: 2 години

Дата на производство: виж опаковката

Партида №: виж опаковката

Тегло нето: 10 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:

Сипкам Оксон С.П.А./ SIPCAM OXON S.P.A.

Via Sempione 195 – I20016 Pero (MI) – ITALY

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 1164

София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76