



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ *РВМ-364*

София, *28.02.2018* г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 540/07.02.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № 7732/09.06.2017 г. на фирма Лаинко С.А., Испания, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КОКТЕЛ**

Активно вещество: Глифозат – 180 г/л
МЦПА – 180 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Лаинко С.А., Испания

Функция на продукта за растителна защита: Хербицид

Вид на формулацията: разтворим концентрат СЛ

Категория на употреба: Втора професионална

Размер и материал на опаковката: полиетиленови (РЕ) бутилки/бидони – 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л, 10 л и 20 л.

Продуктът е заявен по чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и реферира към данните на ПРЗ ГАЛАКСИЯ СЛ разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01282–ПРЗ - 1/30.01.2015 г.

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяването чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделска земя, с цел опазване

на нецелевите растения

1.3. Прилага се с ниско налягане (1-3 атм) в доза 400-600 мл/дка, като най-ниските дози се използват срещу едногодишни, а най-високите дози срещу многогодишни плевели.

1.4. Да се избягва засягането на зелените части на растението за предотвратяване на фитотоксичност.

1.5. Да не се прилага в млади насаждения на възраст под 3-4 години.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срока на валидност на идентичния продукт за растителна защита, а именно до 31.12.2018 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко С.А., Испания.

6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РР М-364/28.02.2018 г.

Име на продукта: **КОКТЕЛ**

Формулация: **разтворим концентрат СЛ**

Концентрация на активното вещество: **Глифозат – 180 г/л; МЦПА – 180 г/л**

№	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение			Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитието и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	г/мл продукт /дка Мин//макс	Вода л/дка Мин//макс		
1.	Ябълки, круши и цитрусови култури	(b)	(c)	Глифозат – 180 г/л + МЦПА – 180 г/л	СЛ	Ръчна пръскачка с удължител с дюза или щанга и навесна/пръскачка	Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято	2	90 дни	400-600 мл/дка	30-50 л/дка	гр. а.в./дка - 108+108 г а.в./дка	(m)
2.	Маслини					а, с контролни рана и насочена струя	Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-есен		180 дни			15 дни	

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятелите, листни гъби, плевели
- (d) Напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба