



ЗАПОВЕД

19.11.2025 г.

X РД11-3515/19.11.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 57, чл.60 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42, чл. 51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-5574/11.11.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 6044/23.03.2023 г. и Заявление с вх. № 18220/13.08.2025 г. от Адама Агрикалчър БВ., Нидерландия, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 6278/14.03.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Разрешение № 01546-ПРЗ-Издание: 2/15.11.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ЗЕТРОЛА 100 ЕК**, съдържащ активното вещество пропаквизафоп - 100 г/л, с притежател на разрешението „Адама Агрикалчър Б.В.“, Нидерландия, както следва:
 - 1.1. На стр. 1 в частта „**Активно/и вещество/а:**“ текстът „пропаквизафоп – 100 г/л“ се заменя с „пропаквизафоп (proaquizafor) – 100 г/л“.
 - 1.2. На стр. 1 в частта „**Активно/и вещество/а:**“, „**Производител/и**“ текстът „Адама Куена Н.В., Кюрасао“ се заменя с „Адама Куена Н.В., Кюрасао/ Adama Cuena N.V., Curacao“.
 - 1.3. На стр. 1 в частта „**Функция на продукта**“ текстът „хербици“ се заменя с „хербицид със системно действие“.

- 1.4. На стр. 1 в частта „Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба:“ текстът „Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия“ се заменя с „Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия/ Adama Agriculture BV, The Netherlands“.
- 1.5. На стр. 1 да се добави текста „Продуктът ЗЕТРОЛА 100 ЕК е идентичен на продукта за растителна защита АЖИЛ 100 ЕК/ШОГУН 100 ЕК, разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01093-ПРЗ-Издание № 7/09.06.2025 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните“.
- 1.6. На стр. 1 в частта „Срок на валидност:“ датата „30.11.2022 г.“ се заменя с „28.02.2028 г.“

Мотиви по т. 1.6:

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1757 на Комисията от 11 септември 2023 г. срокът на одобрението на активното вещество пропаквизафоп се удължава до 28 февруари 2027 г.

- 1.7. На стр. 2 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.
- 1.8. Да се добави частта „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
- 1.9. Частта „Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272 и Регламент (ЕО) 547/2011:“ се заменя с Приложение № 3 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.7., 1.8. и 1.9:

Със Заявление с вх. № 6044/23.03.2023 г. от Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия се заявява разрешаване на допълнителни употреби на ПРЗ АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК.

Горепосоченото заявление е оценено от ЦОРХВ, предоставен е доклад за оценка в БАБХ с писмо с вх. № 6278/14.03.2025 г. и е издадено Разрешение № 01093-ПРЗ-Издание № 7/09.06.2025 г. на ПРЗ АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК.

Продуктът ЗЕТРОЛА 100 ЕК е идентичен на продукта за растителна защита АЖИЛ 100 ЕК/ШОГУН 100 ЕК, разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01093-ПРЗ-Издание № 7/09.06.2025 г. на изпълнителния директор на БАБХ. В тази връзка

разрешението на ПРЗ ЗЕТРОЛА 100 ЕК се привежда в съответствие с разрешението на ПРЗ АЖИЛ 100 ЕК/ ШОГУН 100 ЕК.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия/ Adama Agriculture BV, Netherlands.
3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, В 14-дневен срок от издаване на настоящата заповед, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
4. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ЗЕТРОЛА 100 ЕК**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01546-ПРЗ-Издание: 2/15.11.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.11.2025 г.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
В.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
Signed by: VALENTIN BORISOV ATANASOV

19.11.2025 г.

X РД11-3515/19.11.2025

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЗЕТРОЛА 100 ЕК**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активното вещество: пропаквизафоп - 100 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карант инен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интер вал между прилож ения та (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/ макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Домати, лук, захарно цвекло, памук	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	След ВВСН 11 Домати – първи същински лист на основното стъбло Лук – първи лист ясно видим Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени Памук – първи същински лист разтворен	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка *** 100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 – 20,0 *** 10,0- 15,0 г а.в./дка	Домати, лук – 30 дни Захарно цвекло - 45 дни Памук – 90 дни	* срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ** срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; *** срещу балур, при височина на балура 10-20 см

2	Соя	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	След ВВСН 11 (разтваря се първата двойка същински листа)	1	-	75-120 мл/дка	20-60 л/дка	7,5-12,0 г а.в./дка	90 дни	срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см
3	Слънчоглед	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	След ВВСН 11 (котиledonите са напълно разтворени)	1	-	80 мл/дка	20-60 л/дка	8,0 г а.в./дка	90 дни	срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см

4	Маслодайна рапица	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (разтворен първи лист)	1	-	*50 мл/дка ** 75-120 мл/дка ***150-200 мл/дка ****100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*5,0 **7,5-12,0 ***15,0-20,0 ****10,0-15,0 г а.в./дка	90 дни	*срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките **срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ***срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см ****срещу балур, при височина на балура 10-20 см
5	Лозя	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой – омокване на зърната)	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 – 20,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	30 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см

6	Картофи	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (разтваряне на първите листа на главното стъбло)	1	-	*75-120 мл/дка; **150 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	40 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см
7	Тютюн, леща	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 Тютюн – първи същински лист на основното стъбло Леща – разлистен първи лист	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 – 20,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	Тютюн – 40 дни Леща – 50 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см
8	Ябълки, круши	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН 00-86 (покой - напреднало узряване; увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) След поникване на плевелите:	1	-		20-60 л/дка		30	

					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		
					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		
9	Праскови, нектарини	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 00-85 (покой - оцветяването се развива)	1	-		20-60 л/дка		30	
					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		
					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		
10	Кайсии, сливи, череша	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 00-59 (покой - повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици (бял бутон))	1	-		20-60 л/дка		-	

					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		
					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		
11	Черупкови овощни видове	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 00-59	1	-		20-60 л/дка		-	
					Едногодишни житни плевели: От фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото			75-120 мл/дка		7.5-12 г а.в./дка		
					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			150-200 мл/дка		15-20 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-150 мл/дка		10-15 г а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-3515/19.11.2025

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЗЕТРОЛА 100 ЕК**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активното вещество: пропаквизафоп - 100 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интер вал между прило жения та (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс		
1	Моркови, магданоз – корен, спанак	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвен ционална наземна техника	Моркови, магданоз, спанак – разтворен първи същински лист	1	-	*75-120 мл/дка; **150 мл/дка ***100- 150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0 ***10,0- 15,0 г а.в./дка	30 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см

2	Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла, нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 Патладжан – първи същински лист на основното стъбло Чесън – първи лист ясно видим Броколи – разтворен първи същински лист Фасул – развитие на първите листа Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче Бакла, нахут - разлистен първи лист Лен – първи същински лист разтворен Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа	1	-	*75-120 мл/дка; **150-200 мл/дка ***100-150 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **15,0-20,0 ***10,0-15,0 г а.в./дка	Патладжан, чесън, броколи – 30 дни Варива (фасул, грах, бакла нахут) – 50 дни Пресни (фасул, грах)- 40 дни Лен – 90 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см
---	---	---	--	--------------------------------	---	---	---	--	-------------	---	--	--

3	Копър	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища	Конвенционална наземна техника	След ВВСН 11 (първи същински лист разтворен)	1	-	*75-120 мл/дка; **125 мл/дка ***100-125 мл/дка	20-60 л/дка	*7,5-12,0 **12,5 ***10,0 - 12,5 г а.в./дка	30 дни	*срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото **срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ***срещу балур, при височина на балура 10-20 см
4	Ориз	П	Едногодишни житни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди сеитба на културата ВВСН <00 След поникване на едногодишните житни плевели: от фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото	1	-	75-120 мл/дка	20-60 л/дка	7.5-12 г а.в./дка	-	
5	Резене	П	Едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч балур от коренища	Конвенционална наземна техника	ВВСН >11 на културата след поникване на плевелите: Едногодишни житни плевели: от фаза 2-3 листа до удължаване на стъблото	1	-	75-120 мл/дка	20-60 л/дка	7.5-12 г а.в./дка	30	

					Многогодишни житни плевели: 15-20 см височина на плевелите			125 мл/дка		12.5 г а.в./дка		
					Балур: 30-40 см височина			100-125 мл/дка		10-12.5 г а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

X

 РД11-3515/19.11.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност при вдишване, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H304 H319 H351 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H304 H319 H351 H411	EUH066 – Повтаряща се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. EUH208 - Съдържа пропаквизафоп. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe3