



ЗАПОВЕД

№ *РРМ-1262*

София, *12.07*..... 2018 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 2616/02.07. 2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 15059/13.11.2017 г на фирма Индустриас Афраза С.А, Испания с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЛЕГАДО**

Активни вещества : азоксистробин - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Индустриас Афраза С.А, Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л и 5 л бутилка/туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да не се прилага върху изкуствено отводнени почви със съдържание на глина по-голямо или равно на 45% за приложение при зимни зърнено - житни култури с цел опазване на водните организми.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води за приложение при пролетни зърнено - житни култури, с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, с включена 5 метра непрекъсната растителна ивица до повърхностни води за приложение при зимни зърнено - житни култури, с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, с включена 20 м непрекъсната растителна ивица до повърхностни води за приложение при домати и тиквови култури на открито и в парници (тунелни съоръжения с непостоянен характер), с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2022 г.
5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Индустриас Аффраза С.А, Испания.
6. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.....

Търговско наименование на продукта: Легадо
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активно/и вещество/а: азоксистробин (250 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложения (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Краставици, корнишони, тиквички	О	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)	1-3	10	80 мл/продукт /дка	50-100 л/дка	20 г а.в./дка	1	(m)
2.	Пъпеши, тикви, дини	О	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)	1-3	10	80 мл/продукт /дка	50-100 л/дка	20 г а.в./дка	3	
3.	Домати	О	Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (първо съцветие изправена китка, първа цветна пъпка-пълна зрялост)	1-2	10	80-100 мл/продукт /дка	50-100 л/дка	25 г а.в./дка	3	

4.	Пшеница (зимна и пролетна)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), ръжда (<i>Puccinia spp.</i>), листни петна (септориоза) (<i>Septoria tritici</i>), фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>)	Конвенци онална наземна техника	ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)	1	-	100	20-40	25	35	
5.	Ечемик (зимен и пролетен)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), ръжда (<i>Puccinia spp.</i>), листен пригор (<i>Rhynchospor ium secalis</i>), хелминтоспо риоза (<i>Helminthosp orium spp.</i>)	Конвенци онална наземна техника	ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене- край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)	1	-	100	20-40	25	35	

6.	Ориз	П	пирикулярно за (<i>Puccinia oryzae</i>), хелминтоспо риоза (<i>Helminthosp orium spp.</i>)	Конвенци онална наземна техника	пролет BVCH 43-87 (средна фаза на вретене: на влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восьмична зрелост (твърда консистенция))	1	-	100	20-40	25	28
----	------	---	--	--	--	---	---	-----	-------	----	----

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
- (d) Напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) g/kg или g/l
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 2 към Заповед №.....*22.11.2022*

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда, Остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда, Хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN208 съдържа 1, 2-бензизотиазол-3 (2H)-он. Може да предизвика алергична реакция. EUN401	SP фрази: SP1;Sрe2; SPe3