



ЗАПОВЕД

№ *РРМ-398*

София, *22.02*..... 2019 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 665/12.02.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № 13404/28.08.2015 г. и с вх. № 16943/22.11.2018 г. на фирма „Лаинко С.А.“, Испания с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта:

ЛАИНКОБРЕ М

Активно вещество:

меден оксихлорид-386 г/кг (Cu-220 г/кг)-
кандидат за замяна
манкоцеб - 175 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: „Lainco S.A.“, Spain/„Лаинко С.А.“, Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: намокрим прах (ВП)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 15 г, 40 г, 100 г, 250 г, 500 г – алуминиеви комплексни сашета и плиетиленови сашета;
- 1 кг, 4 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг – хартиени торби

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и респираторна маска по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици по време на прилагане на продукта;
- 1.2. Да се носят защитни очила/защитна маска за лицето при работа с концентрирания продукт;
- 1.3. При повторно влизане в третираните площи - при високите култури работниците да носят защитни ръкавици и защитно облекло;
- 1.4. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра с дюзи намаляващи отнасянето на струята с 50%, или дюзи намаляващи отнасянето на струята с 98% с цел опазване на водните организми – при употреба на продукта при маслини, портокали и грейпфрут;
 - 1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностните води или дюзи намаляващи отнасянето на струята с 90% с цел опазване на водните организми – при употреба на продукта при лозя винени и десертни сортове;
 - 1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностните води или дюзи намаляващи отнасянето на струята със 70% с цел опазване на водните организми - за употреба на продукта при домати, патладжан, картофи и други клубеноплодни зеленчуци и декоративни видове (цветя и украсни видове);
 - 1.8. Да не се надвишава максималната годишна стойност от 4 кг/хектар мед.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество меден оксихлорид съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.01.2020 г.
 5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЛАИНКОБРЕ М** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЛАИНКОБРЕ М** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Лаинко С.А.“, Испания.
 8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
 9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846 /14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАВХ)



ПГ/ПРЗТК/БАВХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 86/11-3.58/22 02 13

Търговско наименование на продукта: Лаинкобре М
 Формулация: намокрим прах (ВП)
 Концентрация на активно/и вещество/а: * меден оксихлорид - 386 г/кг (Cu - 220 г/кг)
 ** манкоцеб – 175 г/кг

№	Култура и/или описание	П О и л и и з	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Кара нтин ен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин /макс (k)	Интерва л между Приложение н. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вола л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка		
1.	Лозя (винени сортове)	П	(b)) (c) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)	1-3	10	240-600	60-100	52.8**+42** 132**+105**	21	(m)
2.	Лозя (десертни сортове)	П	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)	1-3	10	240-600	60-120	52.8**+42** 132**+105**	21	
3.	Домати и патладжан	П	Картофена мана (<i>Phytophthora sp.</i>)	Конвенционал на наземна техника	От ранните стадии на развитие на културата до 3 дни преди прибиране на реколтата	1-3	10	240-600	60-100	52.8**+42** 132**+105**	3	

4.	Картофи	П	Мана (<i>Phytophthora sp.</i>)	Конвенционал на наземна техника	От ранните стадии на развитие на културата до 15 дни преди прибиране на реколтата	1	-	240-600	60-100	52.8*+42** 132*+105**	15	
5.	Портокали и грейпфрут	П	Фитофторно гниене (<i>Phytophthora sp.</i>)	Конвенционал на наземна техника	Третиране през зимата	1	-	400-600	100- 150	88*+70** 132*+105**	15	
6.	Маслини	П	<i>Cycloconium oleaginum</i>	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 10-85 Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта	1-3	10	320-600	80-100	70.4*+56** 132*+105**	15	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели

(d) Напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCRF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) l/kg или g/l

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №...*РА М-398/22.02.2019г.*

Търговско наименование на продукта: Лаинкобре М
 Формулация: намокрим прах (ВП)
 Концентрация на активно/и вещество/а: * меден оксихлорид - 386 г/кг (Cu - 220 г/кг)
 ** манкоцеб – 175 г/кг

№	Култура и/или описание	П О и л и и 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Кара нтин ен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вола л/дка Мин/макс	г а.в./ дка		
1.	Лозя (винени сортове)	(b)	(c)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)	1-3	10	240-600	60-100	52.8*+42** 132*+105**	21	(m)
2.	Лозя (лесертни сортове)	П	Антракноза (<i>Elsinoe ampelina/Gleosporium ampelophagum</i>), бактериоза (<i>Xanthomonas sp.</i>)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 13-89 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)	1-3	10	240-600	60-120	52.8*+42** 132*+105**	21	
3.	Цветя и украсни видове	П / О	Мана (<i>Pegonopora sp.</i>), септориоза (<i>Serptoria sp.</i>), антракноза, ръжда (<i>Puccinia sp.</i>), <i>Venturia sp.</i>	Конвенционал на наземна техника	От ранните стадии на развитие на културата до прибиране	1-3	10	240-600	50-100	52.8*+42** 132*+105**	-	
4.	Маслини	П	Бактериоза (<i>Pseudomonas sp.</i>)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 10-85 Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта	1-3	10	320-600	80-100	70.4*+56** 132*+105**	15	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита **ЛАИНКОБРЕ М** за контрол на антракноза (*Elsinoe ampelina/Gleosporium ampelophagum*) и бактериоза (*Xanthomonas sp.*) - при лозя (винени и десертни сортове), мана (*Peronospora sp.*), септориоза, (*Septoria sp.*), антракноза, ръжда (*Russinia sp.*) и *Venturia sp.* - при цветя и украсни видове и срещу бактериоза (*Pseudomonas sp.*) - при маслини.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на **ЛАИНКОБРЕ М** за контрол на антракноза (*Elsinoe ampelina/Gleosporium ampelophagum*) и бактериоза (*Xanthomonas sp.*) - при лозя (винени и десертни сортове), мана (*Peronospora sp.*), септориоза, (*Septoria sp.*), антракноза, ръжда (*Russinia sp.*) и *Venturia sp.* - при цветя и украсни видове и срещу бактериоза (*Pseudomonas sp.*) - при маслини, е на лицето прилагачо продукта.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
- (d) Напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCRF Кодове – GFAР Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 3 към Заповед № *РДМ-398/21 от 19*
 ...

<u>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibiliзация, категория 1 Сериозно увреждане на очите, категория 1 Токсичност за репродукцията, категория 2* Опасен за водната среда, остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда, хронична опасност, категория 1	H317 H318 H361d H400 H410	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H317 H318 H361d H410	EUH401 EUH032: При контакт с киселини се отделя много токсичен газ.	SP фрази: SP1, SPe 3

*Поради съдържанието над 1% на а.в. манкоцеб с класификация Токсичност за репродукцията, категория 2, H361d.