РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-1125

София, ...04.06.... 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1758/14.05.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15689/16.10.2019 г. от фирма Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция/Nissan Chemical Europe S.A.S., France, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 12872/10.09.2018 г. от Химконсулт ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПИЛОТ УЛТРА**

Активно вещество: хизалофоп-П-етил (quizalofop-P-ethyl) - 50 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Нисан Кемикъл Юръп С.А.С, Франция/ Nissan Chemical Europe S.A.S., France

Производител на активното вещество хизалофоп-П-етил: Нисан Кемикъл Корпорейшън., Япония/ Nissan Chemical Corporation, Japan

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л и 5 л бутилки от HDPE (полиетилен с висока плътност) с вътрешен слой полиамид (COEX), съдържащи се в картонени опаковки.

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане на продукта, защитни ръкавици, защитен гащеризон и здрави обувки по време на прилагане на продукта.

1.2 Да се използват защитни ръкавици при повторно влизане в третираните площи.

1.3 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество хизалофоп-П-етил, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **30.11.2022 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПИЛОТ УЛТРА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПИЛОТ УЛТРА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За Изпълнителен директор:
инж. арх. Виолета Ангелова
Зам. Изп. директор: .....
Заповед за заместване № РД-11-916
от 12.05.2021г.

СЛ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.РД.11-1125/01.06.2021г.

Търговско наименование на продукта: **ПИЛОТ УЛТРА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: хизалофоп-П-етил – 50 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1	Моркови	П	Едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-47 (разтворен първи същински лист – 70 % от очаквания диаметър на корена е достигнат) при плевелите: ВВСН 16-41 на едногодишните (6 истински листа - удължаване на флаговия лист) ВВСН 12 на многогодишните (2 истински листа)	1	-	100-150 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка	21	Не повече от 1 приложение на култура * При балур (Sorghum halepense) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: първо: 100 мл/дка, второ: 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка
			Многогодишни житни плевели*					150-300 мл/дка		7.5-15.0 г а.в./дка		

2	Захарно цвекло	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-35 (разлистени 3 листа – листата покриват 50 % от повърхността) при плевелите: ВВСН 12-22 на едногодишните (2 истински листа – 2 видими братя) ВВСН 12-32 на многогодишните (2 истински листа – 2 видими удължени междувъзлия)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	60	Не повече от 1 приложение на култура * При балур (Sorghum halepense) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: първо: 100 мл/дка, второ: 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка
3	Домати	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-81 (първи същински лист на основното стъбло – 10% от плодовете с типичен цвят на зреене) при плевелите: ВВСН 15-28 на едногодишните (5 истински листа – 8 видими братя) ВВСН 21-29 на многогодишните (братене)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	21	

4	Зелен фасул с шушулки	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-69 (един развит лист – край на цъфтежа; първите чушки се виждат) при плевелите: ВВСН 20-30 на едногодишните (начало на братене – начало на удължаване на стъблото)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	21	Не повече от 1 приложение на култура * При балур (Sorghum halepense) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: първо: 100 мл/дка, второ: 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка
5	Бобови култури	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-67 (първи същински лист – цъфтежа е завършен) при плевелите: ВВСН 20-30 на едногодишните (начало на братене – начало на удължаване на стъблото)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	45	
6	Маслодайна рапица	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-50 (разтворен първи лист – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа) при плевелите: ВВСН 13-27 на едногодишните (3 истински листа – 7 видими братя)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	90	

7	Слънчоглед	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-51 (първи лист – поява на цветен бутон между най-горните листа) при плевелите: ВВСН 13-23 на едногодишните (3 истински листа – 3 видими братя) ВВСН 13-20 на многогодишните (3 истински листа – начало на братене)	1	-	100-150 мл/дка 150 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5 г а.в./дка	45	Не повече от 1 приложение на култура * При балур (Sorghum halepense) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: първо: 100 мл/дка, второ: 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка
8	Картофи	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-74 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (>4 см) – 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер) при плевелите: ВВСН 12-23 на едногодишните (2 истински листа – 3 видими братя) ВВСН 22-24 на многогодишните (2 видими братя – 4 видими братя)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	45	

9	Памук	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-76 (първи същински лист разтворен – приблизително 60% от семенниците достигат крайния си размер) при плевелите: ВВСН 16-23 на едногодишните (6 истински листа – 3 видими братя) ВВСН 16-35 на многогодишните (6 истински листа – 5-ти стъблен възел)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	45	Не повече от 1 приложение на култура * При балур (Sorghum halepense) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: първо: 100 мл/дка, второ: 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка
10	Соя	П	Едногодишни житни плевели Многогодишни житни плевели*	Механизирана наземна техника	ВВСН 11-49 (разтваря се първата двойка същински листа – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните си размери) при плевелите: ВВСН 11-23 на едногодишните (първи същински лист – 3 видими братя) до ВВСН 43 на многогодишните (начало на оформяне на класа)	1	-	100-150 мл/дка 150-300 мл/дка	20-40 л/дка	5.0-7.5 г а.в./дка 7.5-15.0 г а.в./дка	90	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед №..РД11-1125/01.06.2021г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H319 H400 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H319 H411	EUH401	SP1 SPe3