

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!

ЕЪРУАН СК

AIRONE SK

ВНИМАНИЕ!



ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Фунгицид/ Бактерицид

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: мед 272 г/л (под формата на меден хидроксид - 237.3 г/л и меден оксихлорид - 238,6 г/л)

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат (СК)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Р. България със Заповед № РД11-766/17.04.2019г. и Заповед № РД11-112/18.01.2023г. на изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употреба, на ПРЗ № 01711-ПРЗ-1/ 23.04.2019г.

ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА: КСБ Агрисайънс България ЕООД ,
1407 София, ул. Хенрик Ибсен № 15

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Gowan Italia S.r.l., Via Morgani 68, 48018 Farnza, Ravenna, Italy/
Гован Италия С.р.л., Италия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ ЗА ОПАСНОСТ:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN208 Съдържа 2,2,2-(хексахидро-1,3,5-тризин-1,3,5,-триил) триетанол. Може да предизвика алергична реакция.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните или национални разпоредби.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища;

SPe1 Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активно вещество медно съединение (Cu-мед) в доза надхвърляща 4 кг мед (Cu – мед)/хектар годишно върху една и съща площ, с цел опазване на почвообитаващите организми;

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи отвяването с 50% при лозя, цитрусови култури, семкови и костилкови овощни култури, кестен, лешник, орех, киви и маслини до повърхностни води, с цел опазване на водните организми;

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица при тиквови култури със и без ядлива кора, маруля, лук, украсни култури, цветя, чесън и домати до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

Еъруан СК е формулация суспензионен концентрат (СК), съдържащ мед под формата на меден хидроксид и меден оксихлорид. Използва се за превантивни третираня за контрол на различни заболявания при редица култури. Следователно ефикасността се засилва от доброто покритие на растенията с работния разтвор.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

- **ЛОЗЯ** за контрол на Мана (*Plasmopara viticola*) и Черно гниене (*Guignardia bidwellii*) с доза **200 мл продукт/дка**, приложено с 20-60 л вода/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „първите реси се освобождават от пъпката“ (BBCH 13-60).

Максимален брой приложения: 3 през 7 дни. **Карантинен срок:** 21 дни.

*Максимален брой третираня на сезон – 5 за всички болести при лози.

- **ЛОЗЯ** за контрол на Мана (*Plasmopara viticola*) и Черно гниене (*Guignardia bidwellii*) с доза **250 мл продукт/дка**, приложено със 100 л вода/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „първите реси се освобождават от пъпката“ до „зърната формират цвят“ (BBCH 60-83).

Максимален брой приложения: 5 през 7 дни. **Карантинен срок:** 21 дни.

*Максимален брой третираня на сезон – 5 за всички болести при лози.

- **СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ (ябълки, круши, дюли, круши-Наши)** за контрол на Струпясване (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*) и Бактериални болести (*Pseudomonas syringae* pv. *Syringae*) с доза **300 мл продукт/дка**, приложено с 50-150 л вода/дка

Момент за приложение при струпясване: От фенофаза „край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки“ до „видими цветни пъпки (все още затворени)“ (BBCH 03-55).

Момент за приложение при бактериални болести: От фенофаза „нарастването на леторастите е завършило, листната пъпка е развита, листата са все още изцяло зелени“ до „видими цветни пъпки (все още затворени)“ (BBCH 91-55).

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** няма

- **ЯБЪЛКИ** за контрол на Нектриален рак (*Nectria galligena*) с доза 400 мл продукт/дка, приложено с 50-150 л вода/дка

Момент за приложение: От фенофаза „нарастването на леторастите е завършило, листната пъпка е развита, листата са все още изцяло зелени“ до „видими цветни пъпки (все още затворени“ (BBCH 91-55).

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** няма

- **СЛИВИ** за контрол на Бактериални болести и Струпясване (*Venturia carpophila*) с доза 400 мл продукт/ дка, приложено със 100-150 л вода/дка

Момент за приложение: От фенофаза „растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени“ до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55)

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** няма

- **ЧЕРЕШИ** за контрол на Бактериални болести с доза 400 мл продукт/дка, приложено със 100-150 л вода/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „Растежът на леторастите е завършил: листата са наситено зелени“ до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55).

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** няма

- **ПРАСКОВИ (за консумация и за преработка)** за контрол на Бактериални болести и Къдравост по прасковата (*Taphrina deformans*) с доза 400 мл продукт/дка, приложено със 100-150 л вода/дка

Момент за приложение: От фенофаза „растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени“ до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55).

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** няма

- **КАЙСИИ** за контрол на Сачмянки (*Stigmina carpophila*, *Xanthomonas sp.*, *Pseudomonas sp.*) с доза 400 мл продукт/ дка, приложено със 100-150 л вода/дка

Момент за приложение: От фенофаза „растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени“ до „при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени“ (BBCH 91-55).

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** няма

- **ДОМАТИ (полско и оранжерийно производство)** за контрол на Картофена мана (*Phytophthora infestans*), Бактериални болести (*Xanthomonas sp.*, *Pseudomonas sp.*) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка за полското производство и 50-120 л вода/дка за оранжерийното производство.

Момент за приложение: От фенофаза „5-ти същински лист на главното стъбло“ до „пълна зрялост“ (BBCH 15-89)

Максимален брой приложения: 5 през 7 дни **Карантинен срок:** 3 дни.

- **ДОМАТИ за преработка (полско производство)** за контрол на Картофена мана (*Phytophthora infestans*) и Бактериални болести (*Xanthomonas sp.*, *Pseudomonas sp.*) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/ дка

Момент за приложение: От фенофаза „5-ти същински лист на главното стъбло“ до „пълна зрялост“ (BBCH 15-89)

Максимален брой приложения: 5 през 7 дни **Карантинен срок:** 10 дни.

- **КРАСТАВИЦИ и ТИКВИЧКИ (полско и оранжерийно производство)** за контрол на Мана (*Pseudoperonospora cubensis*) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка за полското производство и 50-120 л вода/дка за оранжерийното производство.

Момент за приложение: От фенофаза „трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен“ (BVCH 13)

Максимален брой приложения: 4 през 7 дни **Карантинен срок:** 3 дни.

- **ПЪПЕШ** за контрол на Мана (*Pseudoperonospora cubensis*) с доза 250 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка

Момент за приложение: Фенофаза „трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен“ (BVCH 13)

Максимален брой приложения: 5 през 7 дни **Карантинен срок:** 7 дни.

- **ЛУК И ЧЕСЪН** за контрол на Мана (*Peronospora destructor*) с доза 270 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/ дка

Момент за приложение: Фенофази „4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и прегънати“ (BVCH 14-47).

Максимален брой приложения: 4 през 7 дни **Карантинен срок:** 3 дни.

- **ОРЕХ** за контрол на *Xanthomonas arboricola* pv. *Juglandis* Бактериални болести с доза 350 мл продукт/дка, приложено със 150-180 л вода/дка

Момент за приложение: BVCH 00-99.

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** 14 дни.

- **ЛЕШНИК** за контрол на Бактериални болести *Cytospora avellani* с доза 300 мл продукт/дка, приложено със 150-180 л вода/дка

Момент за приложение: BVCH 00-99.

Максимален брой приложения: 1 **Карантинен срок:** 14 дни.

- **КЕСТЕН** за контрол на *Mycosphaerella maculiformis* с доза 300 мл продукт/дка, приложено със 150-180 л вода/ дка.

Момент за приложение: BVCH 00-99.

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** 14 дни.

- **МАРУЛИ (полско производство)** за контрол на Мана *Peronospora sp.*, *Bremia lactucae* с доза 250 мл продукт/ дка, приложено със 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „разтворен трети същински лист“ (от BVCH 13).

Максимален брой приложения: 4 през 7 дни **Карантинен срок:** 7 дни.

- **КИВИ** за контрол на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, Бактериални болести: *Pseudomonas viridiflava*, *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* едно приложение с доза 300 мл продукт/дка в BVCH 90-63 или две приложения с минимален интервал от 15 дни с доза 180 мл продукт/дка от BVCH 63. Количество вода: 100-150 л вода/дка

Карантинен срок: 20 дни.

- **МАСЛИНИ** за контрол на Пауново око (*Cycloconium oleaginum*), Антракноза (*Spilocaea oleaginea*), Бактериални болести (*Pseudomonas spp.*, *Pseudomonas savastanoi* pv. *Savastanoi*) с доза 210 мл продукт/дка, приложено със 100 л вода/дка

Момент за приложение: От фенофаза „консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло“ до „край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразуване“ (BVCH 89-69).

Максимален брой приложения: 2 през 14 дни **Карантинен срок:** няма

****Третира се при отсъствие на плодове.**

- **ЦИТРУСОВИ КУЛТУРИ (грейпфрут, портокал, лимон, лайм, мандарини)** за контрол на Фитофторно гниене (*Phytophthora sp.*) с доза 400 мл продукт/дка, приложено със 100-150 л вода/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологичното окапване на плодовете“ (BVCH 73).

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен срок:** 14 дни.

- **ЦВЕТЯ И УКРАСНИ ВИДОВЕ** за контрол на Мани, Церкоспороза, Антракноза (*Gloeosporium sp.*), Ръжди, Бактериоза (*Pseudomonas syringae*), Листни напетнявания (*Mycosphaerella sp.*, *Curvularia sp*) с доза 270 мл продукт/ дка, приложено със 60-100 л вода/дка.

Момент за приложение: независимо от фазата на развитие.

Максимален брой приложения: 4 през 7 дни **Карантинен срок:** няма

- **ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ** за контрол на Мани, Церкоспороза, Антракноза (*Gloeosporium sp.*), Ръжди, Бактериоза (*Pseudomonas syringae*), Листни напетнявания (*Mycosphaerella sp.*, *Curvularia sp*) с доза 270 мл продукт/ дка, приложено с 50-150 л вода/дка.

Момент за приложение: независимо от фазата на развитие.

Максимален брой приложения: 1. **Карантинен:** няма

ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УПОТРЕБИ: Конвенционална наземна техника

СМЕСВАНЕ: Уверете се, че пръскачката е чиста и калибрирана преди употреба. Напълнете наполовина резервоара за пръскане с чиста вода и включете разбъркването. Добавете нужното количество Еъруан СК и останалата вода. Да се разбърква добре по време на приложението. Разбъркването да продължава до приключване на пръскането.

КОЛИЧЕСТВО ВОДА: Уверете се, че се използва достатъчно количество вода, за да се осигури добро покритие на растенията. За конвенционално третиране препоръчаното количество вода е минималното посочено. За оранжерийни култури се прилага максималното количество, като се използва достатъчно вода, за да се осигури пълно покритие на културата.

Внимание: Винаги избягвайте пръскане на култури, които са подложени на стрес по време на прилагането.

СЪВМЕСТИМОСТ: Еъруан СК е съвместим с много продукти за растителна защита. Винаги проверявайте етикета на партниращият продукт и го прилагайте при одобрените условия. Следвайте националното законодателство при смесване с други одобрени продукти за растителна защита.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване/ зареждане и прилагане на продукта. **Да се** използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитно работно облекло при повторно влизане в третираните площи. **Да не** се яде, пие и пуши при работа с продукта. **След** контакт с кожата и очите, измийте незабавно с много вода. **Да не** се вдишва аерозола.

Измийте ръцете и изложената кожа преди хранене и след работа.

СЪХРАНЕНИЕ: Дръжте в оригинален контейнер, плътно затворен и на безопасно място.

ПЪРВА ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун. При контакт с очите: Незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. В случай на поглъщане: При никакви обстоятелства не предизвиквайте повръщане.

ОСЪЩЕСТВЕТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НЕЗАБАВНО! В случай на вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го оставете на топло и в покой. **В случай на спешност се свържете с Център за първа помощ:** УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ тел. +359 2 9154 409, тел. +359 2 9154 233 или на единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРОДУКТА: След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

ПРЕОПАКОВАНО ОТ: „Агропал ООД“, гр. София, ул. Хан Богров № 22, тел. 02/ 944 62 50

Производител: Гован Кроп Протекшън Лимитед/ Gowan Crop Protection Limited, Обединено кралство

Дата на производство: виж опаковката

Партиден номер: виж опаковката

Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение