



ЗАПОВЕД

№ *P.Д.М-1917*

София, *23.08*.2021 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 3005/18.08.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 8774/22.06.2018 г. и 1510/22.01.2020 г. от Дау Агросайънсис Експорт САС/Dow AgroSciences Export SAS, Френска република, с упълномощен представител „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД и Писма с вх. № на БАБХ: 12815/10.06.2021 г. и 12316/07.06.2021 г. от „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КВЕЛЕКС**

Активно вещество:

халауксифен-метил (halauxifen-methyl) - 104, 232 г/кг

флорасулам (florasulam) – 100 г/кг

клоквинтоцет киселина (cloquintocet acid) – 70,8 г/кг (антидот)

Производител на продукта за растителна защита: Кортева Агрисайънс ЛЛЦ/Corteva Agriscience LLC, САЩ

Производител на активното вещество халауксифен-метил:

- The Dow Chemical Company, USA
- CalaChem Fine Chemicals Ltd. United Kingdom

Производител на активното вещество флорасулам:

- The Dow Chemical Company Midland, USA

Производител на антидот клоквинтоцет киселина:

- Шангю Нутриком Колр Лтд/Shangyu Nutrichem Co, Китай
- Джангсу Флаг Кемикъл Индъстри Ко, Лтд, /Jiangsu Flag Chemical Industry Co. Ltd, Китай

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л, 10 л, 15 л и 20 л бутилка/контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

1.2. Да се използват защитни очила/маска и ръкавици при работа с продукта.

1.3. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество халауксифен-метил, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 05.08.2026 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на фирма „Кортева Агрисайънс България“ ЕООД, България.

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №12.11-1917/23.08.2022

Търговско наименование на продукта: КВЕЛЕКС

Формуляция: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: халаксифен-метил - 104, 232 г/кг; флорасулам - 100 г/кг; флоквинтолет киселина -70,8 г/кг (антидот)

№	Култура и/или описание (a)	П О З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Грама продукт/продукт/дка Мин/макс	Вода (литра) /дка Мин/макс	Грама активно вещество и антидот /дка		
1	Зимни зърнено-житни култури: мека и твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	Пролетно приложение ВВСН 21-45 (начало на братене – късна фаза на врегенене)	1	-	2,5 - 5,0 г/дка (в зависимост от заплевяването)	10-40 л/дка	*0,261- *0,522 + **0,25 - **0,5 г а.в./дка + ***0,177 - ***0,354 г антидот /дка	50	(m)

2	Пролетни зърнено-житни култури: мека и твърда пшеница, ечемик и ръж	II	Широколистни плевели Обикновена лепка (<i>Galium aparine</i>) Бяла куча лобода (<i>Chenopodium album</i>) Поветицовидно фасулче (<i>Polygonum convolvulus</i>)	Механизирана наземна техника	Пролетно приложение ВВСН 13-45 (3 листа разтворени-късна фаза на вретене)	1	-	5,0 г продукт/дка	10-40 л/вода	*0,522 + **0,5 г а.в./дка + ***0,354 г антидот/дка	50
3	Овес	II	Широколистни плевели Обикновена лепка (<i>Galium aparine</i>) Росопас (<i>Fumaria officinalis</i>)	Механизирана наземна техника	Пролетно приложение ВВСН 21-30 (начало на брагене - начало на удължаване на стъблото) Фаза на плевелите 3-7 лист	1	-	3 г продукт/дка	10-40 л/дка	*0,313 + **0,3 г а.в./дка + ***0,212 г антидот/дка	50

Означения: халауксифен-метил*; флорасулам**; клоксинтоцет киселина***

- (a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GSPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрасване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

<u>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H410	EUN401 EUN208 - Съдържа динариев малеат (CAS 371-47-1) и карбамиден полимер с формалдехид (CAS 9011-05-6). Може да причини алергична реакция.	SP1 SPe3