



ЗАПОВЕД

№ ... *PLM-2210*

София, ... *24-09* ... 2021 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 3315/13.09.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4031/23.03.2017 г. от фирма Баркли Кемикълс Р&Д Лимитид/Barclay Chemicals R&D Ltd, Ирландия, с упълномощен представител „ХИМКОНСУЛТ“ ООД, Заявление с вх. № 16349/05.12.2017 г. от фирма Баркли Кемикълс Р&Д Лимитид/Barclay Chemicals R&D Ltd, Ирландия, с упълномощен представител „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД и Писмо с вх. № 19333/23.08.2021 г. от „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ГАЛЪП 360-К**

Активно вещество: глифозат (glyphosate) - 360 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Баркли Кемикълс Манюфакчъринг Лимитид/Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Ирландия

Производител на активното вещество глифозат: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на Баркли Кемикълс Р&Д Лимитид, Ирландия

Функция на продукта за растителна защита: тотален хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от HDPE;

2 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 15 л и 20 л контейнер от HDPE;

200 л бидон от HDPE; 640 л и 1000 л контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 При приложение с ръчна пръскачка да се носи работно облекло с дълги ръкави и дълги крачоли по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране, при приложение на продукта в дози по-големи или равни на 400 мл/дка на открито и при точково приложение.

1.5 Да не се прилага този продукт на повече от 10% от площта на парцела при точково приложение, с цел опазване на пчелите и опрашващите насекоми.

1.6 Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения.

1.7 Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат съгласно чл. 32, пар.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 15.12.2023 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Баркли Кемикълс Р&Д Лимитид/Barclay Chemicals R&D Ltd, Ирландия.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ГАЛЪП 360-К** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и

съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ГАЛЪП 360-К** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



За Изпълнителен директор:	<i>[Signature]</i>
Зам.-Изп. директор:	...
Заповед за заместване №	32/11-21/55
от	14.09.2021 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 111-2210/24.09.2024

Търговско наименование на продукта: Галъп 360- К
 Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат - 360 г/л

№	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож. дни (min)	Мили-литра продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	Грама активно вещество/дка Мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	Вид (f-h)							(l)	(m)
1	Маслодайна рапица Зимна пшеница Царевица Аспержи	П	Поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	След сеитба/преди поникване на културите	1	-	100-300 мл продукт/дка	10-30 л/дка	36-108 г а.в./дка	-	
2	Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)	П	Поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Внася се в активна вегетация на плевелите.	1-3	28	200-800 мл/дка (макс. доза на култура/вегетационен период: 1,2 л/дка)	10-30 л/дка	72-288 г а.в./дка (макс. доза на култура/сезон: 432 г а.в./дка)	21	

3	Цитруси	П	Поникнали едногодишни и двугодишни и многогодишни плевели	Конвен- ционална наземна техника	Внася се в активна вегетация на плевелите.	1-3	28	200-800 мл/дка (макс. доза на култура/ вегета- ционен период: 1,2 л/дка)	10-30 л/дка	72-288 г а.в./дка (макс. доза на култура/ сезон: 432 г а.в./дка)	21	
4	Незеделски площи (железопътни линии, промишлени и селски райони)	П	Поникнали едногодишни и двугодишни и многогодишни плевели	Конвен- ционална наземна техника		1-2	-	50-600 мл/дка (800 мл/дка при точково прилагане) (макс. доза на година: 800 мл/дка)	10-30 л/дка	18-216 г а.в./дка (288 г а.в./дка при точково прилагане)	-	
5	Горски насаждения	П	Поникнали едногодишни и двугодишни и многогодишни плевели	Конвен- ционална наземна техника	През цялата година, като се избягва контакт с дърветата	1-2	-	50-600 мл/дка (800 мл/дка при точково прилагане) (макс. доза на година: 800 мл /дка)	25 л/дка	18-216 г а.в./дка (288 г а.в./дка при точково прилагане)	-	

- (а) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCRF Кодове – GFAР Техническа монография №2, 1989
- (f) всячки използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНН – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUH401	SP фрази: SP1 SPe3