



ЗАПОВЕД

№ ... *РЗМ-225*
София, *17.02* 2022 г.

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-542/03.02.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 5948/07.04.2020 г. от *Байер България ЕООД*,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАЮНИС**

Активни вещества: биксафен / bixafen - 75 г/л

спироксамин / spiroxamine - 150 г/л

трифлуксистробин / trifloxystrobin - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Байер С.А.С., Франция

Производител на активните вещества биксафен, спироксамин и трифлуксистробин: Байер АГ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка и 3 л, 5 л, 10 л, 15 л туба от COEX HDPE/EVOH или COEX HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване, зареждане и прилагане, както и защитни очила/маска за лицето и дихателна защита по време на смесване и зареждане;


1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

1.3. Да не се засаждат грудкови /клубеноплодни култури в период от 365 дни и варива/ориз, зърнено – бобови култури в период от 120 дни, след употреба на продукта;

- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растително защитна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при зимни зърнено-житни култури;
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с дюзи, намаляващи отвяването с 50 % или от 5 метра с дюзи, намаляващи отвяването с 90% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при пролетни зърнено-житни култури;
- 1.6. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми - опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им;
- 1.7. Притежателят на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ КАЮНИС да предостави в БАБХ изследването „Cronic larve study (bees)“ в срок до 24 месеца, считано от датата на издаване на настоящата заповед.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество спироксамин съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2024 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАЮНИС се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАЮНИС съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Байер България* ЕООД.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 211-225/17-02. 2022г.

Търговско наименование на продукта: КАЮНИС

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно/и вещество/а: биксафен* (75 г/л), спироксамин** (150 г/л), трифлуксистробин*** (100 г/л)

№	Култура и/или описание	П/О / 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение	Норма на приложение				Карантинен срок (дни)	Забележки
(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/дка Мин//макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка	(l)
1	Мека и твърда пшеница (зимна и пролетна)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i> f.sp. <i>tritici</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), мрежовидни листни петна (<i>Pyrrenophora tritici-secalis</i>), ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>)	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)	1-2	21	80-100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	6,0-7,5* + 12,0-15,0** + 8,0-10,0*** г а.в./дка	-
2	Ечемик (зимен и пролетен)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) по зимен ечемик, мрежести петна (<i>Pyrrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), рамулария (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)	1-2	21	80-100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	6,0-7,5* + 12,0-15,0** + 8,0-10,0*** г а.в./дка	-

SPe 8

3	Тритикале (зимно и пролетно)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i> f.sp. <i>tritici</i>), ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)	1-2	21	80-100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	6,0-7,5* + 12,0-15,0** + 8,0-10,0*** г а.в./дка	-	
4	Ръж (зимна и пролетна)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i> f.sp. <i>tritici</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)	1-2	21	80-100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	6,0-7,5* + 12,0-15,0** + 8,0-10,0*** г а.в./дка	-	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. тризници или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РБ/11-225/14.02.2022

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Дразнене на кожата, категория 2	H315	GHS05	H315	EUN401	SP 1
Кожна сенсibilизация, категория 1	H317	GHS07	H317		SPe 3
Сериозно увреждане на очите, категория 1	H318	GHS08	H318		SPe 8
Остра инхалаторна токсичност, категория 4	H332	GHS09	H332		
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3	H335	Опасно	H335		
Токсичност за репродукцията, категория 2	H361d		H361d		
Токсичност за репродукцията, допълнителна категория за ефекти върху или чрез лактацията	H362		H362		
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2	H373		H373		
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1	H400		H410		
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410				