

ПРОЕКТ НА ЕТИКЕТ

Продукт от паралелна търговия

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА!**

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкциите за употреба!

СЯРА ВГ МАКС

ФУНГИЦИД/АКАРИЦИД

Сигнална дума
ВНИМАНИЕ



ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Фунгицид/Акарицид.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Сяра 800 г/кг

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:

Вододиспергируеми гранули (ВГ)

РАЗРЕШЕН ЗА паралелна търговия в Р. България със Заповед No РД11-1569/08.07.2022г на Изп.Директор на БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита за паралелна търговия No 02030 – ПРЗ/18.07.2022г.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

Непрофесионална – за употреба от лица навършили 18 години.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Agrostulln GmbH, Werksweg 2, D-92551 Stulln, Germany,
Тел. +49 9435/3069-0; Факс: +49 9435/3069-14; e-mail:info@agrosulln.de

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО и ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА
ПАЗАРА:** „Агрофарм“ ООД, гр.Пазарджик, ул.“Царица Йоанна“6Е, тел.034 44 59
92, 44 59 96

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

СЯРА ВГ МАКС е контактен фунгицид с предпазно действие и акарицид.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P102+P405 Да се съхранява извън обсега на деца. Да се съхранява под ключ.

P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

P270 Да не се яде, пие и пуши при употреба на продукта.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. /Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и птища).

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

SPe3 С цел опазване на нецелеви членестоноги, да се осигури нетретирана буферна зона от необработена земя:

5 метра за лозя, хмел и декоративни растения, когато третирането се извършва с конвенционални дюзи. 10

метра при други дървесни култури и горски дървета, когато третирането се извършва с употребата на дюзи за

намаляване отнасянето на струята с 50 % или 5 метра при употребата на дюзи за намаляване на отнасянето със

75 %, или 3 метра при употреба на дюзи за намаляване на отнасянето с 90 %.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

При работа с продукта: Да не се яде, пие и пуши по време на употреба на продукта. Да се носи защитно работно облекло, подходящи ръкавици, маска за лицето, защитни очила и ботуши по време на разбъркването/натоварването и по време на прилагането. Работниците трябва да носят защитно облекло и ръкавици ако влизат в третираните площи преди препаратът да е изсъхнал напълно.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЯРА ВГ МАКС се прилага, когато условията благоприятстват развитието на болестите или при първите симптоми на нападение от акари. Разрешен е за пускане на пазара и употреба при следните култури и неприятели:

Култура	Вредител	Време на прилагане	Продукт г/дка	Работен разтвор л/дка	Максимален брой приложения/ интервал между третиранията/дни/
Ябълки, круши	Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha)	При благоприятни условия за развитие на болестта.	600	100-150	8/през 7 дни

		преди цъфтеж, при поява на зелени и розови пъпки.			
	Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>)	След цъфтежа при опадване на венчелистчетата			
Праскови, нектарини, кайсии, череши, сини сливи	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Podosphaera</i> spp.)	При благоприятни условия за развитие на болестта	600	50-150	8/през 7 дни
Лозя /винени и десертни сортове/	Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	До ВВСН 61 /начало на цъфтеж 10% опадане на ресите/	100-600	100-150	1-4/през 7-14 дни
		От ВВСН 61 /начало на цъфтеж 10% опадане на ресите/	50-300		
	Лозова краста (<i>Eriophyes vitis</i>)	Преди разпукване на пъпките	1500	50-150	През 10 дни
Лешник	Брашнеста мана (<i>Phyllactinia guttata</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	8/през 7 дни
	Акари (<i>Eriophye</i> spp., <i>Phytoptus avelanae</i>)	При поява на акрите			
Бадем	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	8/през 7 дни
Ягоди /П и О/	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	8/през 10-14 дни
	Акари (<i>Eriophye</i> spp., <i>Aculops lycopersici</i>)		500-750		
Къпини, малини, боровинки	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podosphaera aphanis</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	6/през 14 дни
Моркови, цвекло, репички, червено цвекло, пащърнак /П и О/	Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> spp., <i>Oidium</i> spp.)	При благоприятни условия за развитие на болестта	300-400	50-100	8/през 7-10 дни
Чесън, лук /П/	Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	300-400	50-100	8/през 7-10 дни
Домати, патладжани, пипер /П и О/	Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	300	50-100	8/през 7-10 дни
	Паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), акари (<i>Eriophye</i> spp.), домотов акар (<i>Aculops lycopersici</i>)				
Краставици, тиквички, тикви, пъпеши /П и О/	Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	При благоприятни условия за развитие на болестта	300	50-100	8/през 7-10 дни
Зеле, цветно зеле,	Брашнеста мана	При благоприятни	300	50-100	8/през 7-15 дни

броколи, брюкселско зеле /П и О/	(Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.) Паяжинообразуващ акар (Tetranychus spp.),	условия за развитие на болестта			
Салата, спанак, ендивия, цикория, къдрава ендивия /П/	Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum, Oidium spp.) Паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)	При благоприятни условия за развитие на болестта	400	50-100	8/през 7-10 дни
Артишок	Брашнеста мана (Leveillula taurica, Oidium spp.) Паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	8/през 7-10 дни
Фасул /зелен/, зрял фасул, сух грах, нахут	Брашнеста мана (Erysiphe spp., Oidium spp.)	При благоприятни условия за развитие на болестта	300-400	50-100	8/през 7-10 дни
Грах	Брашнеста мана (Erysiphe pisi., Oidium spp.)	При благоприятни условия за развитие на болестта	300-400	50-100	8/през 7-10 дни
Картофи	Брашнеста мана (Leveillula taurica)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	8/през 7 дни
Слънчоглед	Брашнеста мана (Erysiphe spp.)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	2/през 7 дни
Соя				60-100	2/през 14 дни
Захарно цвекло	Брашнеста мана (Erysiphe betae)	При благоприятни условия за развитие на болестта	750-1000	20-60	2/през 14 дни
	Паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)	При поява на акарите	480	40-100	3
Пшеница, ечемик, овес	Брашнеста мана (Erysiphe graminis)	Първо третиране при поява на 1-ви симптоми, второ третиране в начало на изкласяване-при силно нападение на последно листо	750-1000	20-60	2/през 14 дни
Хмел	Брашнеста мана (Podosphaera macularis)	При благоприятни условия за развитие на болестта	750-1200	100-200	8/през 7 дни
	Паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)	При поява на акарите			
Тютюн	Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)	При благоприятни условия за развитие на болестта	400	50-100	8/през 7 дни
Декоративни растения /П/	Брашнеста мана (Sphaerotheca spp., Podosphaera pannosa) Акари (Panonychus ulmi, Tetranychus	Когато леторастите са с дължина 10- 15см. Повтаря се в зависимост от интензивността на нападение	300	50-100	8/през 7 дни

	uticae)				
Горски видове Топола	Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)	При благоприятни условия за развитие на болестта	500	50-100	3/през 7 дни

КАРАНТИНЕН СРОК: не се изисква

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Резервоарът на пръскачката се напълва до половината с вода, след което се включва бъркалката, изсипва се необходимото количество от продукта и резервоарът се допълва с вода до получаване на необходимото количество работен разтвор. Разбъркването на разтвора трябва да продължи и по време на пръскането.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: При лозя не трябва да се прилага близо до прибиране на реколтата, тъй като оставя петна по плодовете.

СМЕСИМОСТ: Да не се смесва с продукти с продукти с алкална реакция и парафинови масла.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ ИЛИ ПРИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИКА: Да се потърси веднага лекарска помощ и да се покаже етикета на лекаря. **ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:** Незабавно измийте внимателно и старателно с душ за очи или с вода в продължение на няколко минути. Ако е необходимо, потърсете медицинска помощ. **ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:** Да се измие с обилно количество вода и сапун. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** Изплакнете устата. Да се пие вода на малки глътки (ефект на разреждането). Да не се предизвиква повръщане. Веднага потърсете медицинска помощ. **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Преместете пострадалия на чист въздух. Ако е необходимо потърсете медицинска помощ.

ПОЛЕЗНИ ЗА ЛЕКАРЯ УКАЗАНИЯ: Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния – София, телефони 02/91-54-346 и 02/91-54-426

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки на сухо, хладно и добре проветрявано място, далеч от източници на запалване.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: При високи температури (над 30 °C) може да причини изгаряне по растенията. Може да е фитотоксичен за тиквови, както и за някои сортове ябълка (напр. Старкинг, Делишъс и др.), круша (напр. Д'анжу и др.) и кайсия, при условия на силно слънчево греене и високи температури.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ: В случай на инцидентно разливане на продукта, да се покрие с абсорбиращ материал. В случай на разсипване, да се събере механично, като се избягва образуването на прах. Да не се допуска замърсяване на повърхностни водни източници и канализационната мрежа. Събраният продукт и/или сместа от продукта и абсорбиращия материал да се постави в специален плътно затварящ се контейнер, който да бъде обозначен. Събраният материал да се унищожи според нормативните изисквания.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи средства за гасене на пожар: водна мъгла, пяна, пудра, въглероден диоксид. Неподходящи средства за гасене на пожар: да не се

използва компактна водна струя. Съществува риск от парна експлозия. Опасни продукти от горенето: горящите материали образуват силно токсичен и дразнещ серен диоксид. В случай на пожар не вдишвайте изпаренията.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Съдържанието на опаковките да се изсипва напълно в резервоара на пръскачката. Празните опаковки (чували, пликове), заедно с кутиите да се направят негодни за употреба като се нарежат, пробият или смачкат и след това да се предадат за унищожаване като опасен отпадък.

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: Виж маркировката

ПАРТИДЕН №: Виж маркировката

НЕТО: 25 кг; 1кг; 900 г; 500г; 300г; 180 г; 150г; 100г; 60г; 50г