

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

СЕРЕНАДА АСО СК

Продукт от паралелна търговия

ФУНГИЦИД

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ: АГРОПАЛ ООД, ул. Хан Богров №22, кв. Горни Богров 1806 София, Тел. 02/9946250

НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – Разрешение № 02097-ПРЗ-1/24.08.2023г. и Заповед № РД 11-1883/08.08.2023г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ: АГРОПАЛ ООД, 1806 София, ул. Хан Богров №22, кв. Горни Богров, Тел. 02/9946250

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: *Bacillus amyloliquefaciens* (former subtilis),
щам: QST 713 1×10^9 CFU/г, (еквивалент на 14,1 г/л)

Общоприето ISO наименование/CAS №/ CIPAC №: *Bacillus amyloliquefaciens* (former subtilis) –
CAS № - CIPAC № 661

UFI: QQU1-90KT-F00K-C9NR

ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Суспензионен концентрат – СК

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА – Непрофесионална.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Основни указания – Преместете пострадалия от опасната зона. Транспортирайте пострадалия в стабилно положение (лежащ настрани), покрийте го и го затоплете.

При вдишване – Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с кожата – Измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност – с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължи.

При поглъщане - НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. Изплакнете устата.

Полезни за лекаря показания - Симптоми: Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят

Лечение: Лекувайте симптоматично. Няма специфичен антидот.

При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел.: +359 2 915 43 64, +359 2 915 42 33 или се обадете на тел. 112

РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ: EUN208 Съдържа *Bacillus amyloliquefaciens* (former subtilis), щам: QST 713. Може да причини алергична реакция.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ: SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Бактерията *Bacillus amyloliquefaciens* (former subtilis) е естествен обитател на почвената микрофлора. Нее наблюдаван негативен ефект върху почвени или други организми. Тази бактерия често се появява в сладководни басейни, естуарни и крайбрежни води. Въпреки присъствието и във водна среда, тя не може да се развива, възпроизвежда и оцелява в нея за дълго време поради липсата на подходящи условия. Не е токсична за водните организми и рискът за тях е минимален.

ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА: Продуктът СЕРЕНАДА АСО СК е биологичен фунгицид и бактерицид, който има следните механизми на действие: унищожава хифите на патогените при контакт с тях, предотвратява прикрепването и проникването на патогени върху листата на културата и спира растежа на патогените, като се конкурира с тях за хранителни вещества и пространство за развитие. *Bacillus amyloliquefaciens* (former subtilis) предизвиква устойчивост на културите към патогените, индикирана чрез повишена пероксидазна активност. Този механизъм на действие е от особено значение за борбата с бактериални инфекции, като Огнен пригор (*Erwinia amylovora*).

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура	За борбасрещу	Доза на прилагане мл/дка	Количество работен разтвор на декар – л/дка	Момент на прилагане	Макс. брой приложения за вегетация	Интервал между третиранията
Лозя	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	400	10-150	От фаза първите реси се освобождават от пъпките до фаза плодът е готов за беритба ВВСН 60-89	4	5
Ябълки, Круши	Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>)	400-800	50-150	От фаза отворени първицветове до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер ВВСН 60-79	6	3
Круши	Черни петна (<i>Stemphylium</i> spp.)	400-800	50-150	От фаза отворени първицветове до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер ВВСН 60-79	6	3
Праскови, нектарини, кайсии, череши, сливи, бадеми	Кафяво гниене (<i>Monilinia</i> sp.), Бактериоза (<i>Xanthomonas</i> sp.)	400-800	50-150	От фаза отворени първицветове до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост ВВСН 57-89	6	5
Сливи*	Сиво гниене (<i>Botrytis</i> spp.)	400-800	50-150	От фаза чашелистчетата са отворени; вижда се връхчето на венчето до фаза консумативна зрелост ВВСН 57-89	6	5
Рапица	Склеротиния (<i>Sclerotinia</i> sp.)	200	10-40	От фаза 10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос до фаза край на цъфтежа ВВСН 60-69	2	5
Картофи	Струпяване (<i>Rhizoctonia solani</i>)	250-500	20-50	Сухо семе ВВСН 00	1	-
Марули (при два цикъла на отглеждане в оранжерии)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia</i> sp.), Бактериоза (<i>Xanthomonas</i> sp.)	400-800	20-100	От фаза разтворен третисъщински лист до фаза формирана цялата листна маса ВВСН 13-49	6	5
Марули (на открито)	Склеротиния (<i>Sclerotinia</i> sp.), Струпяване (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500	20-50	От фаза сухо семедо фаза разтворен трети лист ВВСН 0-13	1	-
Краставици (в оранжерии)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Черно стъблено гниене (<i>Mycosphaerella</i> sp. = <i>Didymella bryoniae</i>)	400-800	20-150	От фаза трети същински лист на главностъблото е напълно разтворено до фаза пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост ВВСН 13-89	6	5

Домати, патладжани, пипер (в оранжерии и на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Бактериен пригор (<i>Pseudomonas syringae</i>), Бактериоза (<i>Xanthomonas</i> sp.)	400-800	20-150	От фаза трети същински лист до фаза пълна зрялост ВВСН 13-89	6	5
Домати, патладжани, пипер (в оранжерии)	Бактерийно петносиване (<i>Xanthomonas campestris</i>)	400-800	20-150	От фаза трети същински лист до фаза пълна зрялост ВВСН 13-89	6	5
Домати (в оранжерии и на открито)	Фузариено увяхване (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1000	20-50	От фаза сухо семедо фаза трети същински лист ВВСН 0-13	1	-
Ягоди* (в оранжерии и на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	400-800	20-100	От фаза първи цветоноси на дъното на розетката до фаза втора реколта: повечето цветове са оцветени ВВСН 55-89	6	5
Ягоди* (в оранжерии)	Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> sp.) Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	400-800	20-100	От фаза поява на съцветие до фаза загиване на старите листа, нахъдряне на младите листа, оцветяването на старите листа е специфично за сорта ВВСН 53-95	6	5
Къпини*, малини*, боровинки*, червени боровинки*, касис*, цариградско грозде*, шипки*, черници*, арония* (на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> sp.)	400-800	20-100	От фаза разпукване на пъпките: люспите се отделят и се откриват зелени сектори до фаза половина листа са пожълтели или окапали ВВСН 53-95	6	5
Билки и ароматни култури* (в оранжерии и на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> sp.), Бактериални заболявания	400-800	20-100	От фаза три същински листа или три листни двойки саразтворени до фаза пълна зрялост ВВСН 13-89	6	5
Билки и ядивни цветя*: листа от резене, кориандър, копър, кимион, ловаж, девесил, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, майорана, риган, босилек, маточина, мента, дафинов лист (в оранжерии и на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia</i> sp.), Бактериални заболявания	400-800	20-100	От фаза три същински листа или три листни двойки саразтворени до фаза достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи ВВСН 13-49	6	5
	Склеротиния (<i>Sclerotinia</i> sp.)	500-1000	20-100	От фаза сухо семедо фаза три същински листа или три листни двойки саразтворени ВВСН 0-13	1	-
Билки и ядивни цветя*: листа от резене, кориандър, копър, кимион, ловаж, девесил, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, майорана, риган,	Струпясване (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500-1000	20-100	От фаза сухо семедо фаза три същински листа или три листни двойки саразтворени ВВСН 0-13	1	-

босилек, маточина, мента, дафинов лист (на открито)						
Билки и ядивни цветя*: листа от резене, кориандър, копър, кимион, ловаж, девесил, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, майорана, риган, босилек, маточина, мента, дафинов лист (в оранжерии)	Брашнеста мана (<i>Erysiphe sp.</i>)	400-800	20-100	От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи ВВСН 13-49	6	5
Листа от целина* (в оранжерии и на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-100	От фаза разтворен четвърти същински лист до фаза пълно узряване ВВСН 14-89	6	5
Тютюн*	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sp.</i>)	400-800	20-100	От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза край на цъфтежа ВВСН 13-69	6	5
Праз* (на открито)	Бактериоза (<i>Pseudomonas sp.</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	400-800	20-100	От фаза трети лист (>3см) ясно видим до фаза пълно узряване ВВСН 13-89	6	5
Салатни култури*: главеста маруля, айсбергова маруля, салата, люцерна (италианска	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sp.</i>)	400-800	20-100	От фаза разтворен трет същински лист до фаза типичен размер, форма и твърдост на главите ВВСН 13-49	6	5
валерианела), цикория, дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория, кресон, рукола, листа и разсад от зелеви и други (в оранжерии и на открито)	Склеротиния (<i>Sclerotinia sp.</i>)	500-1000	20-100	От фаза сухо семе до фаза разтворен трет същински лист ВВСН 0-13	1	-
Салатни култури*: главеста маруля, айсбергова маруля, салата, люцерна (италианска	Струпяване (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500-1000	20-100	От фаза сухо семе до фаза разтворен трет същински лист ВВСН 0-13	1	-
валерианела), цикория, дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория, кресон, рукола, листа и разсад от зелеви и други (на открито)						
Бадеми*	Бактериоза (<i>Xanthomonas sp.</i>), Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilia spp.</i>)	400-800	50-150	От фаза първи листа с напълно разтворени петири до фаза консумативна зрялост ВВСН 13-89	6	5

Дюли*, мушмули*	Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>), Бактериални болести	400-800	50-150	От фаза розов бутон до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер ВВСН 57-79	6	5
Райски ябълки*	Листни петна (<i>Mycosphaerellasp.</i>)	400-800	50-150	От фаза розов бутон до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния сиразмер ВВСН 57-75	6	5
Корнишони*, тикви * (в оранжерии и на открито)	Листни петна (<i>Mycosphaerellasp.</i>)	400-800	50-150	От фаза трети същински лист на главностъбло е напълно разтворено фаза пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят назрялост ВВСН 13-89	6	5
	Фузариено увяхване (<i>Fusarium oxysporum</i>)	500-1000	20-100	От фаза сухо семе до фаза трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен ВВСН 0-13	1	-
Зеле* (на открито)	Бактериоза (<i>Xanthomonassp.</i> , <i>Pseudomonas sp.</i>)	400-800	20-100	От фаза разтворен третисъщински лист до фаза пълно узряване ВВСН 13-89	6	5
Декоративни растения*, рязан цвят*, разсадници* (на открито)*	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sp.</i>), Листни петна (<i>Mycosphaerellasp.</i>), Бактериоза (<i>Pseudomonassp.</i>)	400-800	20-150	От фаза три същински листа или три листни двойки саразтворени до фаза пълна зрялост ВВСН 13-89	6	5
	Фузариено увяхване (<i>Fusariumoxysporum</i>)	500-1000	20-100	От фаза сухо семедо фаза три същински листа или три листни двойки саразтворени ВВСН 0-13	1	-
Нар*	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-150	От фаза розов бутон до фаза консумативна Зрялост ВВСН 57-89	6	5
Киви*	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>) Бактериално изсъхване по киви (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>), Бактериен пригор (<i>P. syringae</i> , <i>P. viridiflava</i>)	400-800	50-150	От фаза видими цветни пъпки (все още затворени) до фаза всички листа са окапали ВВСН 55-98	6	5
Лук* (на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-100	От фаза четвърти лист (>3см) ясно видимдо фаза листата са загинали ВВСН 14-49	6	5
Фасул* (на открито)	Бактериоза (<i>Xanthomonassp.</i> , <i>Pseudomonas sp.</i>)	400-800	20-100	От фаза четвърти същински лист разтворено фаза пълно узряване (зърната са твърди) ВВСН 14-89	6	5

Копър*, магданоз* (в оранжерии и на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-100	От фаза четири същинскилиста или четирилистни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер наподлежащите на прибиране вегетативни частиили вегетативни размножителни органи ВВСН 14-49	6	5
Бамя* (на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-100	От фаза четири същинскилиста или четирилистни двойки са разтворенидо фаза пълна зрялост ВВСН 14-89	6	5
Броколи* (на открито)	Бактериоза (<i>Pseudomonassp.</i>)	400-800	20-100	От фаза разтворен четвърти същински листдо фаза достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена) ВВСН 14-49	6	5
Стевия* (на открито)	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-100	От фаза четири същинскилиста или четирилистни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер наподлежащите на прибиране вегетативни частиили вегетативни размножителни органи ВВСН 14-49	6	5
Черен бъз*	Сиво гниене (<i>Botrytis spp.</i>)	400-800	20-100	От фаза първите листа са разтворенидо фаза първите цветове се отворени ВВСН 14-60	6	5
Разсадо производство в субстрат или флоат система* (в оранжерии и на открито)	Фузариено увяхване (<i>Fusarium oxysporum</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sp.</i>), Струпяване (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500-1000	20-50	От фаза сухо семе до фаза поникване ВВСН 00-09	1	-
	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	400-800	20-150	От фаза сухо семедо фаза шест същински листа или шест листни двойки саразтворени ВВСН 00-16	4	5
Орехи*, лешници*	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Бактериоза (<i>Xanthomonassp.</i> , <i>Pseudomonas sp.</i>)	400-800	50-150	От фаза чашелистчетата са отворени до фаза консумативназрялост ВВСН 57-89	6	5
Луковици за цветя* (в оранжерии)	Струпяване (<i>Rhizoctonia solani</i>), Кафяво (питийно) гниене по корените (<i>Pythium spp.</i>)	500-1000	20-50	Сухо семеВВСН 00	1	-

*Минимална култура/ употреба - разрешена по чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Забележка: При разрешените минимални употреби не е документирана ефикасността и няма извършени наблюдения за негативно въздействие върху културата от употребата на продукта. Отговорността по

отношение за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност на тези минимални употреби е на лицето, което употребява продукта.

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА: Използвайте СЕРЕНАДА АСО СК само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта. Да не се прилага СЕРЕНАДА АСО СК чрез напоителни системи/инсталации. За максимална ефикасност, се препоръчва продукта да се прилага преди очаквана поява или в ранни етапи от развитието на патогените. Продуктът може да се използва самостоятелно или в растителнозащитна схема с други продукти за растителна защита. Да не се влиза повторно в третираните площи докато работният разтвор върху култури не изсъхне.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

- Не се изисква.

ДАНИИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ: След приложение на СЕРЕНАДА АСО СК не е наблюдавана сортова чувствителност или въздействие върху съседни или следващи култури.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете до половина резервоара на пръскачката с вода, добавете необходимото количество от продукта, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете сразбъркването до приключване на пръскането.

СМЕСИМОСТ: При развитието на продукта, не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, преди смесването му с друг продукт.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ:

Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Да се осигури подходяща вентилация. Използвайте лични предпазни средства.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, канализация и подпочвени води. Да не се допуска замърсяване на повърхностни или подпочвени води по време на почистване на оборудването или обезвреждане на отпадъците, включително и водата от измиването му. Използвайте продукта според инструкциите в етикета.

В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Средства за почистване: Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, стърготини).

Съберете и пренесете продукта в подходящо етикетирани и плътно затворени контейнери.

Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Почистете с дезинфектанти.

Допълнителен съвет: Носете лични предпазни средства. При евентуално разливане на продукта, да не се допуска попадане в почвата, водни басейни или отпадъчни води.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте воден аерозол, устойчива на алкохол пена, сух химикал или въглероден диоксид.

Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане.

Особени опасности: Образуват се опасни газове в случай на пожар.

Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара. Да не се допуска оттичане на гасителните средства, след гасенето на пожара, в канали или водоизточници.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ - Указаниза безопасна употреба: Не се изискват специални предпазни мерки при работа с неотворени опаковки/контейнери; следвайте съответното ръководство със съвети за работа с продукта.

Да се използват защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за предпазване от пожар и експлозия

Не се изискват специални предпазни мерки.

ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Съхранявайте работното облекло отделно.

Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта. Измийте обилно с вода и сапун след

работа с продукта.

Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново. Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени).

Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място с ограничен достъп. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина.

Да се пази от замръзване.

Препоръки при складиране: Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи.

Температура на съхранение: $> 0^{\circ}\text{C}$

20 °C	40 °C
2 години	8 седмици

Подходящи материали: HDPE (полиетилен с висока плътност).

БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА

Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ) Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно. При употреба, да се изсипва напълно съдържанието на опаковката.

Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третира като опасен отпадък.

Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

СРОК НА ГОДНОСТ – 2 години

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ – Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията.

НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – Виж опаковката