



ЗАПОВЕД

23.1.2025 г.

Х РД11-212/23.01.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 и чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-288/14.01.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 4978/11.03.2022 г. и вх. № 17927/14.09.2023 г. от НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ/ NUFARM GmbH & Co.KG, Австрия, с упълномощен представител КНЕ СЕРТИС ЕООД и писмо с вх. № 25484/03.12.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДЖОУСТ**

Активно вещество: протиоконазол/ prothioconazole - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Нюфарм Кроп Продъктс, Обединено Кралство/ Nufarm Crop Products, United Kingdom

Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ/ NUFARM GmbH & Co.KG, Австрия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕС)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 500 мл, 1 л и 5 л бутилка от HDPE;

10 л и 20 л контейнер от HDPE

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с цел защита на живущи и случайно намиращи се наблизо лица.
 - 1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
 - 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра при едно приложение при зимни и пролетни зърнено-житни култури, при две приложения при зимна маслодайна рапица и лен (само за производство на влакно), при едно приложение при пролетна маслодайна рапица, при едно приложение при синап и камелина, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
 - 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра при две приложения при зимни и пролетни зърнено-житни култури, при две приложения (1 есенно и 1 пролетно приложение) при зимна маслодайна рапица, при 1 есенно приложение при синап и камелина, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
 5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.08.2026 г.**
 6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДЖОУСТ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДЖОУСТ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ/NUFARM GmbH & Co.KG, Австрия.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

□ Ниво 3, TPL-RED □ Ниво 2, TPL-AMBER □ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

23.1.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

23.1.2025 г.

X РД11-212/23.01.2025 г.

Приложение № 1 за разрешения

употреби към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ДЖОУСТ**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕС)

Концентрация на активно/и вещество/а: протиоконазол/ prothioconazole - 250 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/макс	Интер вал между приложе нията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Зимен ечемик	П	Рамулария/ листни петна (<i>Ramularia collo- cygni</i>) (RAMUCC), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) (PUCCHD),	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото - начало на цъфтеж)	1-2	14-21	60 мл/ дка	10-40 л/дка	15 г а.в./дка	35	

			листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) (RHYNSE), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>) (PYRNTE)									
2	Пролетен ечемик	П	Рамулария/ листни петна (<i>Ramularia collo- cygni</i>) (RAMUCC), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) (PUCCHD), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) (RHYNSE), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>) (PYRNTE)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото - начало на цъфтеж)	1-2	14-21	60 мл/ дка	10-40 л/дка	15 г а.в./дка	35	
3	Овес	П	Коронеста ръжда (<i>Puccinia coronata</i>) (PUCCCO)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото - начало на цъфтеж)	1-2	14-21	60 мл/ дка	10-40 л/дка	15 г а.в./дка	35	

4	Пшеница (зимна и пролетна), спелта, едрозърнест и двузърнест лимец, тритордеум	П	Ран листен пригор (<i>Zymoseptoria tritici</i> / <i>Mycosphaerella graminicola</i>) (SEPTTR), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i> / <i>Puccinia tritici</i>) (PUCCRT), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) (PUCCST), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>) (ERYSGR), фузариози (<i>Fusarium spp.</i>) (FUSASP)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтеж) (пролет)	1-2	14-21	60-80 мл/ дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	35	
5	Твърда пшеница	П	Ран листен пригор (<i>Zymoseptoria tritici</i> / <i>Mycosphaerella graminicola</i>) (SEPTTR)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтеж) (пролет)	1-2	14-21	60-80 мл/дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	35	

6	Тритикале (зимно и пролетно)	П	Ран листен пригор (<i>Zymoseptoria tritici</i> / <i>Mycosphaerella graminicola</i>) (SEPTTR), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i> / <i>Puccinia tritici</i>) (PUCCRT), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) (RHYNSE), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) (PUC CST), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>) (ERYSGR), фузариози (<i>Fusarium spp.</i>) (FUSASP)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтеж) (пролет)	1-2	14-21	60-80 мл/дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	35	
---	------------------------------------	---	---	------------------------------------	--	-----	-------	-----------------	----------------	---------------------	----	--

7	Ръж (зимна и пролетна)	П	Ран листен пригор (<i>Zymoseptoria tritici</i> / <i>Mycosphaerella graminicola</i>) (SEPTTR), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) (RHYNSE), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>) (ERYSGR)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтеж) (пролет)	1-2	14-21	60-80 мл/дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	35	
8	Маслодайна рапица (зимна)	П	Сухо стъблено гниене/фомоза (<i>Leptosphaeria maculans</i>) (LEPTMA), бяло гниене (склеротиниоза) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) (SCLESC), брашнеста мана (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) (ERYSCR), черни петна (<i>Alternaria brassicae</i>) (ALTEBA)	Механизирана наземна техника	ВВСН 14-18 (разтворен четвърти лист- разтворен осми лист) (есен) ВВСН 20-59 (няма странични разклонения – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон“)) (пролет)	1-2	90	60-70 мл/дка	10-40 л/дка	15-17,5 г а.в./дка	56	Първо приложение през есента; Второ приложение през пролетта

9	Маслодайна рапица (зимна)	П	Сухо стъблено гниене/фомоза (<i>Leptosphaeria maculans</i>) (LEPTMA), бяло гниене (склеротиниоза) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) (SCLESC), брашнеста мана (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) (ERYSCR), черни петна (<i>Alternaria brassicae</i>) (ALTEBA)	Механизирана наземна техника	ВВСН 20-59 (няма странични разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон“)) (пролет)	1-2	14-28	60-70 мл/дка	10-40 л/дка	15-17,5 г а.в./дка	56	
---	---------------------------------	---	---	------------------------------------	--	-----	-------	-----------------	----------------	-----------------------	----	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПІВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

23.1.2025 г.

X РД11-212/23.01.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интер вал между приложения та (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/дка мин/макс	(l)	(m)
1	Маслодайна рапица (пролетна)	П	Брашнеста мана (Erysiphe cruciferarum) (ERYSCR), Листни петна (цилиндроспороза) (Pyrenopeziza brassicae) (PYRPBR)	Механизирана наземна техника	ВВСН 20-59 (няма странични разклонения- видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон“)) (пролет)	1	-	60-70 мл/ дка	10-40 л/дка	15-17,5 г а.в./дка	56	

2	Лен (само за производство на влакно)	П	Брашнеста мана (Erysiphe spp.) (ERYSP)	Механизирана наземна техника	ВВСН 33-51	1-2	14-28	60-70 мл/дка	10-40 л/дка	15-17,5 г а.в./дка	-	
3	Синап, камелина	П	Сухо стъблено гниене/фомоза (Leptosphaeria maculans) (LEPTMA), бяло гниене (склеротиниоза) (Sclerotinia sclerotiorum) (SCLESC), брашнеста мана (Erysiphe cruciferarum) (ERYSCR), черни петна (Alternaria brassicae) (ALTEBA), листни петна (цилиндроспороза) (Pyrenopeziza brassicae) (PYRPBR)	Механизирана наземна техника	ВВСН 14-18 (есен) ВВСН 20-69 (пролет)	1-2	14-28	60-70 мл/дка	10-40 л/дка	15-17,5 г а.в./дка	56	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **ДЖОУСТ** за разрешените минимални употреби.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **ДЖОУСТ** за разрешените минимални употреби, е на лицето прилагащо продукта.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-212/23.01.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

<u>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на кожата, категория 2	H315	GHS07	H315	EUN401	SP1
	H317	GHS09	H317		SPe3
	H319		H319		
Кожна сенсibiliзация, категория 1	H332	Внимание	H332		
	H400		H410		
Дразнене на очите, категория 2	H410				
Остра токсичност (инхалационна), категория 4					
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1					