



ЗАПОВЕД

11.4.2025 г.

Х РД11-1146/11.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 279/04.01.2024 г., Заявление с вх. № 986/12.01.2024 г. и Заявление с вх. № 24161/15.11.2024 г. от „Сипкам Оксон С.п.А”, Италия, с упълномощен представител „Химконсулт” ЕООД и писмо с вх. № 5077/28.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БРИКСТЪН**

Активно вещество: клетодим (clethodim) - 180 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Сипкам Оксон С.п.А., Италия/ Sipsam Oxon S.p.A., Italy

Производител на активното вещество: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Сипкам Оксон С.п.А”, Италия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,5 л; 1 л; 2 л; 3 л; 5 л; 10 л бутилка; туба от СОЕХ с външен слой HDPE и вътрешен слой от РА

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака, и лични предпазни средства - респираторна маска, защитни очила/маска за лицето, защитни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% до неземеделски земи с цел опазване на растенията.
- 1.5. Продуктът да се прилага на 2-3 м буферна зона при ниски култури и 5 м буферна зона при високи култури, с цел за предпазване на живущи и случайно намиращи се наблизо лица.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество клетодим, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.08.2027 г.
5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БРИКСТЪН** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БРИКСТЪН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „Сипкам Оксон С.п.А”, Италия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

11.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

11.4.2025 г.

X РД11-1146/11.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби

към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **БРИКСТЪН**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активното вещество: клетодим - 180 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Чесън, лук, шалот, вкл. семепроизводство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena</i> sp., <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-45 (втори лист (>3см) ясно видим-достигнат е 50% от очаквания диаметър на	1	-	70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене	15-40	12,6	35	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

					луковицата или стъблото)			100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		
2.	Репички, хрян, ряпа, червено цвекло, пащърнак, моркови, вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena</i> sp., <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист- 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	40	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		

3.	Соя, вкл. семепроизводство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-49 (разтваря се трилистник на 2-ри възел-жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателния си размер)	1	-	70 мл/дка за едно-дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	60	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едно-дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за много-дишни житни плевели		25,2		
4.	Картофи, вкл. семепроизводство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-39 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (>4см)- посева се сгъстява напълно)	1	-	70 мл/дка за едно-дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	40	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		
5.	Захарно цвекло, вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-39 (разлистени 2 листа - край на растежа на стъблото)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	60	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		

6.	Маслодайна рапица, вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 20-30 (няма странични разклонения - начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40 л/дка	12,6	-	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
7.	Резене (фенел), вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena</i> sp., <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-16	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	50	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		

								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		
8.	Домати, патладжан, вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena</i> sp., <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium</i> sp., <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-59 (втори същински лист- девет или повече съцветия)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	28	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		

9.	Люцерна, вкл. семепроизводство	П	Житни плевели <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum sp.</i>)	Конвенционална наземна техника	Приложение след поникване BBCH 12-49	1	-	70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене	15-40	12,6	40	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едногодишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многогодишни житни плевели		25,2		
10.	Памук, вкл. семепроизводство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum sp.</i>)	Конвенционална наземна техника	Приложение след поникване BBCH 12-49 (втори същински лист разтворен-достигане на крайния размер на подлежащите	1	-	70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене		12,6	-	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

					на прибиране вегетативни части)			100-140 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	18-25,2		
								140 мл/дка за многого дишни житни плевели и за балур (<i>Sorghum halepense</i>)		25,2		
								200 мл/дка за контрол на троскот (<i>Cynodon dactylon</i>)		36		
11.	Слънчоглед, вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> ,, <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum sp.</i>)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-33 (два листа- поява на трето удължено междувъзлие)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	-	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		
12.	Лозя	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Poa trivialis</i> , <i>Hordeum sp.</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-79 (покой - повечето от зърната се събират, грозда се затваря)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	3	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		

								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
13.	Киви	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-79	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	7	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
14.	Ябълка, круша, дюля, мушмула	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> ,	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87 (покой - беритбена зрялост)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	10	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

			<i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)					100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
15.	Кайсия, праскова, нектарина, слива	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87 (покой - беритбена зрялост)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	14	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		

16.	Череша	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87 (покой - беритбена зрялост)	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	7	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
17.	Райска ябълка	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> ,	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	10	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

			<i>Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis)</i>					100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
18.	Леска	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	20	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100-133 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18-24		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		

19.	Бадем	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87	2	20	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	20	До две приложения, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
20.	Маслини	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> ,	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87	2	20	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	7	До две приложения, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

			<i>Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis</i>					100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
21.	Цитруси (портокал, мандарина, лимон, лайм, грейпфрут)	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Hordeum</i> <i>sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-89 (покой- консумативна зрялост)	2	20	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	7	До две приложения, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		

22.	Разсадници за овощни видове и лозя	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 00-87 (покой - беритбена зрялост)	2	20	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	12,6	-	До две приложения, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		
								133 мл/дка за многого- дишни житни плевели		24		
23.	Декоративни видове, вкл. семепроизвод ство	П	Житни плевели (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria sp.</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Lolium sp.</i> , <i>Hordeum sp.</i> , <i>Poa trivialis</i>)	Конвенцио нална наземна техника	Приложение след поникване ВВСН 12-71	1	-	70 мл/дка за едного- дишни житни плевели до братене	15-40	9-12,6	-	Едно приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
								100 мл/дка за едного- дишни житни плевели след братене		18		

								140 мл/дка за многого- дишни житни плевели		25,2		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------	--	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1146/11.04.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност при вдишване, категория 1	H304	GHS07	H304	EUH401	SP 1
Кожна сенсibiliзация, категория 1	H317	GHS08	H317	EUH066	SPe 3
Дразнене на очите, категория 2	H319	GHS09	H319		
Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3	H336	Опасно	H336		
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411		H411		