



ЗАПОВЕД

27.5.2025 г.

X РД11-1608/27.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42, чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 3262/14.02.2023 г., Заявление с вх. № 7689/13.04.2023 г. и Заявление с вх. № 1565/22.01.2024 г. от „ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А.”, Нидерландия, с упълномощен представител „ЮПЛ България” ЕООД, и писмо с вх. № 8527/11.04.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КОЛПЕН ДГ**

Активно вещество: сяра (sulphur) - 800 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: ЮПЛ Юръп Лтд., Обединено Кралство/
UPL Europe Limited, United Kingdom

Производител на активното вещество сяра: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А.”, Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид/акарицид с несистемно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 10 кг и 25 кг трислойна хартиена торба от РЕ

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

- 1.2. Да не се прилага ПРЗ КОЛПЕН ДГ при температури по-високи от 30 С, с цел опазване на нецелевите растения.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра или буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% или нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 75% или нетретирана буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90% при костилкови (ранно и късно приложение) семкови видове (ранно и късно приложение) и гори, с цел опазване на нецелевите организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или буферна зона от 5 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 75% при хмел, с цел опазване на нецелевите организми.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или буферна зона от 3 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 50% при тропични плодове, с цел опазване на нецелевите организми.
- 1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% или да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 75 % при лозя, с цел опазване на нецелевите организми.
- 1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или 3 метра буферна зона с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% при плодови храсти и декоративни растения, с цел опазване на нецелевите организми.
- 1.8. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използването на ПРЗ КОЛПЕН ДГ. Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество съра, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2027 г.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КОЛПЕН ДГ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КОЛПЕН ДГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А.“, Нидерландия.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

27.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

27.5.2025 г.

X РД11-1608/27.05.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **КОЛПЕН ДГ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: **сяра - 800 г/кг**

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	Грама продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама а. в./ дка		
1.	Пшеница, тритикале, спелта	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-65 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа)	2	21	1000	8-40	800	-	
2.	Ечемик	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis f. sp hordei</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31–59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на цъфтежа)	2	21	1000	8-40	800	-	

3.	Ябълки, круши, круши Наши, дюли, мушмули	П	Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>), струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 55-59 (видими цветни пъпки (все още затворени) – повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) или ВВСН 19-39 (първи напълно развити листа - леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина)	8	10-12	750	50- 150	600	-	
			За подобряване качеството на плодовете		ВВСН 19-59 (първи напълно развити листа - повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) и ВВСН 71-75 (размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване-	8	10-12	750	50- 150	600		
4.	Праскови, нектарини, кайсии	П	Брашнеста мана (<i>Podosphaera tridactyla</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-83 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – начало на оцветяване)	8	10-12	750	70- 150	600	-	
5.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 09-89 (разпукване на пъпките: ясно се виждат зелените върхове на	8	10	1250	20- 100	1000	-	При спазване на Закона за пчеларството
			Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>)			2	10	1250	20- 100	1000	-	

			Акари: лозова краста (<i>Colomerus vitis/Eriophyes vitis</i>), <i>Calepitrimerus vitis</i>		леторастите - плодът е готов за беритба)	1	-	2000	20- 100	1600	-	
6.	Домати, патладжани	П/О	Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>), бронзова акариоза причинена от акари (<i>Eriophye sp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 19-79 (Девет или повече листа по главното стъбло - Девет и повече китки с плодове с типичен размер)	2	10	750	75- 100	600	-	
7.	Пъпеши, дини, тикви и други тиквови култури с неядлива кора	П/О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 15-89 (Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	8	7-10	750	20- 100	600	-	
8.	Захарно цвекло, червено цвекло, промишлено и фуражно цвекло	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe betae</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 39-49 (листата покриват 90 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)	2	30	750	8-40	600	-	
9.	Артишок	П	Брашнеста мана (<i>Oidium sp.</i> , <i>Erysiphe sp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85 (трети лист (>3 см) ясно видим – напреднала зрялост: >50% от главите имат изцяло кафяво-жълт цвят.)	2	14	750	20-40	600	-	
10.	Цикория за корен	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe sp.</i>)	Конвенционална наземна техника	-	2	14	1000	20-40	800	-	

11.	Спанак, листа от цвекло, тученица	П/О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-49	2	7	750	20-40	600	1	
12.	Лешници	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe suffulta</i>)	Конвенционална наземна техника	до ВВСН 32 (Веgetативният летораст около 20 % от крайната дължина)	2	14	750	20-40	600	-	
13.	Малини, къпини	П/О	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca macularia</i>) акари (<i>Phytoptus</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85 (разтворен трети лист – узряване на първите плодове)	3	14	750	20-40	600	1	
14.	Касис, цариградско грозде, боровинки	П/О	Брашнеста мана (<i>Eriophyes ribis</i> , <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> , <i>Microsphaera grossulariae</i> , <i>Erysiphe suffulta</i>) акари (<i>Phytoptus</i> sp., <i>Eriophyes ribis</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85 (разтворени листа – узряване на първите плодове)	3	14	750	20-40	600	3	
15.	Манго	П	Брашнеста мана	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85	4	14	750	20-40	600	-	
16.	Папая	П	Брашнеста мана	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85	4	14	250	20-40	312,5	-	
17.	Козя брада	П	Брашнеста мана (<i>Erisiphe</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-87	8	7	750	20-40	600	-	

18.	Рози	П	Брашнеста мана (<i>Stemphylium</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта (януари-декември)	8	10	750	100	600	-	
-----	------	---	---	-----------------------------------	--	---	----	-----	-----	-----	---	--

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

27.5.2025 г.

X РД11-1608/27.05.2025

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **КОЛШЕН ДГ**
Формуляция: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: сяра - 800 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	Грама продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Череша, сливи	П	Брашнеста мана (<i>Podosphaera tridactyla</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-83 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа-начало на оцветяване)	2	10-12	1000	70-150	800	-	
2.	Хмел	П	Брашнеста мана (<i>Podosphaera</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта ВВСН 13-49	8	7	750	20-40	600	-	
3.	Етеричномаслени, ароматни и лечебни растения	П/О	Брашнеста мана (<i>Oidium</i> sp., <i>Erisiphe</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта ВВСН 13-87	8	7	750	20-40	600	-	
4.	Растения за производство на семена - етеричномаслени, ароматни и лечебни растения, цветя и зеленчуци	П/О	Брашнеста мана (<i>Oidium</i> sp., <i>Erisiphe</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта ВВСН 13-87	8	7	750	20-40	600	-	

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

27.5.2025 г.

X РД11-1608/27.05.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

<i>Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
-	-	-	-	EUH401	SP 1 SPe 3 SPe 8