



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

31.7.2026 г.

Х РД11-1921/31.07.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4030/24.07.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 15399/08.08.2023г., от ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия / UPL Holdings Cooperatief U.A., The Netherlands, с упълномощен представител ЮПЛ България ЕООД и писмо с вх. № 17322/19.06.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЮКОН УЛТРА**

Активни вещества: Мед (триосновен меден сулфат) / Copper (Tribasic Copper Sulphate) – 80г/л
Сяра / Sulphur – 640 г/л

Производител на продукта за растителна защита: ЮПЛ Юръп Лтд., Обединено Кралство / UPL Europe Ltd., UK.

Производител на активното вещество: Мед (триосновен меден сулфат) - информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия / UPL Holdings Cooperatief U.A., The Netherlands.

Производител на активното вещество: Сяра - информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия / UPL Holdings Cooperatief U.A., The Netherlands.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид и бактерицид с несистемно действие.

Вид на формулацията : суспензионен концентрат (СК)

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл бутилка от PET,

1л бутилка от HDPE,

5 л, 10 л и 20 л бидон от HDPE,

220 л варел от HDPE,

1000 л ICB контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се осигури 20 метра буферна зона, с включена 20 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води при лоза (винени и десертни сортове), цвекло (захарно цвекло, крмно цвекло, червено цвекло, жълто цвекло), домати, патладжани с цел опазване на водните организми.

1.3. Да се осигури 25 метра буферна зона, с включена 20 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води при маслини, с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури 30 метра буферна зона, с включена 20 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води при орех, лешник, бадеми, кестен и шамфъстък, с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури 10 метра буферна зона, с включена 10 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води при зимна и пролетна пшеница, твърда пшеница, тритикале, ръж и лимец с цел опазване на водните организми.

1.6. Опасен за пчелите/ Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители/. Да не се използва, където има активна паша на пчели /Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използването на ПРЗ ЮКОН УЛТРА / Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност/ Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

1.7. Да се осигури 5 метра буферна зона, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 75%, до неземеделски земи при лозя (винени и десертни сортове), домати, патладжани, цвекло (захарно цвекло, крмно цвекло, червено цвекло и жълто цвекло), с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране ИЛИ Да се осигури 3 метра буферна зона, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90%, до неземеделски земи при лозя (винени и десертни сортове), домати, патладжани, цвекло (захарно цвекло, крмно цвекло, червено цвекло и жълто цвекло), с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.8. Да се осигури 20 метра буферна зона, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 75%, до неземеделски земи при маслини, орех, лешник, бадеми, кестен и шамфъстък с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране ИЛИ Да се осигури 15 метра буферна зона, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90%, до неземеделски земи при маслини, орех, лешник, бадеми, кестен и шамфъстък с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.9. Да се осигури 1 метър буферна зона, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50%, до неземеделски земи при зимна и пролетна пшеница, твърда пшеница, тритикале, ръж и лимец, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.10. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ мед, с годишна доза, по-висока от 400 г мед/дка годишно с цел опазване на почвените организми.

1.11. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ сяра, при зимна и пролетна пшеница, твърда пшеница, тритикале, ръж и лимец, преди фаза на развитие на културата ВВСН < 30 с цел опазване на почвените организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество Сяра / Sulphur съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.07.2028 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЮКОН УЛТРА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЮКОН УЛТРА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия / UPL Holdings Cooperatief U.A., The Netherlands.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

11. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

31.7.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

31.7.2026 г.

X РД11-1921/31.07.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ЮКОН УЛТРА

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: *мед (триосновен меден сулфат) (80 г/л), **сяра (640 г/л)

	Култура и/или описание	П О / З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Кара нтин ен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у приложения (дни)	л продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1.	Лозя (винени и десертни сортове) (VITVI)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe necator</i>) (UNCINE - Powdery mildew) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) (PLASVI - Downy mildew) Черно гниене (<i>Phyllosticta ampellicida</i>) (GUIGBI - Black rot)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	ВВСН 09-89 (Разпукване на пъпките: ясно се виждат зелените върхове на леторастите - Плодът е готов за беритба)	1-12	5	0,4-1 л/дка	5-100 л/дка	32-80* г/дка 256-640** г/дка	7	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка* средно на година) Препоръчителен интервал на доза: 0,4—1 л продукт / дка в зависимост от броя приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400г а.в. мед /дка за година. Да не се прилага по време на цъфтеж! (ВВСН 60-69)

2.	Цвекло (захарно цвекло, кръмно цвекло, червено цвекло и жълто цвекло) (BEAVA)	П	Брашнеста мана (Erysiphe betae) (ERYSBE - Powdery mildew)	Конвенци онална наземна техника Листно приложе ние	ВВСН 19-49 (Разлистени 9 или повече листа — кореноплодите са в техническа зрялост)	1-5	7	0,55-1 л/дка	20-40 л/дка	44- 80* г/дка 352- 640** г/дка	14	
3.	Домати, (LYPES)	П	Картофена мана по домати (Phytophthora infestans) (PHYTIN - Late blight) Алгернария (кафяви листни петна) (Alternaria solani) (ALTESO - Early blight) Брашнеста мана (Leveillula taurica (LEVETA) - Powdery mildew) Бактериални болести (Xanthomonas spp.) (XANTSP Bacterial leaf spot) Бактериоза (Pseudomonas spp.) (PSDMSP Bacterial speck)	Конвенци онална наземна техника Листно приложе ние	От ВВСН 15 - (Пети същински лист)	1-8	5	0,4-1 л/дка	10-100 л/дка	32- 80* г/дка 256- 640** г/дка	3	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно на година)** Препоръчителен интервал на доза: 0,4 — 1 л продукт/дка в зависимост от приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400г а.в.мед/дка за година Да не се прилага по време на цъфтеж! (ВВСН 60-69)

4.	Маслини (OLVEU)	П	Струпясване (<i>Venturia oleagina</i>) (CYCLOL, Leaf spot of olive) Антракноза (<i>Colletotrichum</i> spp.) (COLLSP, Anthracnosis) Бактериоза (<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv) (PSDMSA, bacterial canker)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	От ВВСН 10 (Отделяне на първи лист)	1-6	7	0,4-1 л/дка	10-200 л/дка	32-80* г/дка 256-640 г/дка	14	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно на година)** Препоръчителен интервал на доза: 0,4—1 л продукт/дка в зависимост от броя приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400 г а.в.мед/дка за година Да не се прилага по време на цъфтеж! (ВВСН 60-69)
5.	Орехи, бадеми, кестен и шамфъстък (IUGRE, PRNDU, CSNSA, PIAVE)	П	Бактериоза (<i>Xanthomonas</i> spp.) (XANTSP Bacterial leaf spot) (<i>Pseudomonas</i> spp.) (PSDMSP Bacterial speck) Цитоспора (<i>Cytospora corylicola</i>) (CYTOCO Canker) Къдравост (<i>Polystigma ochraceum</i>) (POLTOC) (<i>Taphrina</i> spp.) (TAPHSP)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	От ВВСН 03 (Край на набъбване на пъпките. Люспите на вегетативната пъпка и гломерула започват да се отделят и отварят. Пъпките са видимо набъбнали, но новите листа все още не се виждат)	1-8	7	0,4-1 л/дка	10-150 л/дка	32-80* г/дка 256-640** г/дка	14	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно за година)** Препоръчителен интервал на доза: 0,4 —1 л продукт/дка в зависимост от броя приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400г а.в.мед/дка за година

6.	Лешник (CYLAV)	П	Бактериоза (Xanthomonas spp.) (XANTSP Bacterial leaf spot) (Pseudomonas spp.) (PSDMSP Bacterial speck) Къдравост (Polystigma ochraceum) (POLTOC) (Taphrina spp.) (TAPHSP)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	От BBCH 03 (Край на набъбване на пъпките. Люспите на вегетативната пъпка и гломерула започват да се отделят и отварят. Пъпките са видимо набъбнали, но новите листа все още не се виждат)	1-8	7	0,4-1 л/дка	10-150 л/дка	32-80* г/дка 256-640** г/дка	14	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно за година)** Препоръчителен интервал на доза: 0,4 — 1 л продукт/дка в зависимост от броя приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400г а.в.мед/дка за година
7.	Зимна и пролетна пшеница, твърда пшеница, тритикале, ръж, лемец (TRZAW, TRZDU, TTLSS, SECCE, TRZSP)	П	Септория (Septoria tritici) (SEPTTR-Leaf spot of wheat)	Конвенционална наземна техника	След поникване до BBCH 59 (Край на изкласяването: класът напълно се е показал под влагалището на флаговия лист)	1-2	7	0,5 - 0,8 л/дка	10-50 л/дка	40-64* г/дка 320-512** г/дка	35	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. хапеши / гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(f-h) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) Карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват степен на употреба / икономическо значение / рестрикции

31.7.2026 г.

X РД11-1921/31.07.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ЮКОН УЛТРА

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: *мед (триосновен меден сулфат) (80 г/л), **сяра (640 г/л)

№	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у приложения (дни)	л продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1	Цвекло (захарно цвекло, крѐмно цвекло, червено цвекло и жълто цвекло) (BEAVA)	П	Церкоспороза (кафяви листин петна) (Cercospora beticola) (CERCBE - Leaf spot)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	ВВСН 19-49 (Разлистени 9 или повече листа — кореноплодите са в техническа зрялост)	1-5	7	0,55-1 л/дка	20-40 л/дка	44-80* г/дка 352-640** г/дка	14	

2	Домати, (LYPES)	II	Антракноза (Colletotrichum spp.) (COLLSP - Antrachnosis) Бактерийно увяхване (Clavibacter michiganensis) (CORBMI, Bacterial canker)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	От ВВСН 15 - (Пети същински лист)	1-8	5	0,4-1 л/дка	10-100 л/дка	32- 80* г/дка 256- 640** г/дка	3	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно на година)** Препоръчителен интервал на доза: 0,4 — 1 л продукт/дка в зависимост от приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400г а.в.мед/дка за година Да не се прилага по време на цъфтеж! (ВВСН 60-69)
3	Маслини (OLVEU)	II	Лилави петна по маслина (Pseudocercospora cladosporioides) (CERCCL, violet spot of olive)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	От ВВСН 10 (Отделяне на първи лист)	1-6	7	0,4-1 л/дка	10-200 л/дка	32- 80* г/дка 256- 640 г/дка	14	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно на година)** Препоръчителен интервал на доза:0,4 — 1 лпродукт / дка в зависимост от броя приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400 г а.в.мед/дка за година Да не се прилага по време на цъфтеж! (ВВСН 60-69)

4	Лешник (CYLAV)	П	Цитоспора (Cytospora corylicola) (CYTOCO Canker)	Конвенционална наземна техника Листно приложение	От ВВСН 03 (Край на набъбване на пъпките. Люспите на вегетативната пъпка и гломерула започват да се отделят и отварят. Пъпките са видимо набъбнали, но новите листа все още не се виждат)	1-8	7	0,4-1 л/дка	10-150 л/дка	32- 80* г/дка 256- 640** г/дка	14	Общо приложеното не трябва да надвишава 2,8 кг мед/дка за 7 години (т.е. 0,4 кг мед/дка средно за година)** Препоръчителен интервал на доза: 0,4 —1 л продукт/дка в зависимост от броя приложения, като максималната доза не трябва да надвишава 400г а.в.мед/дка за година
---	-------------------	---	--	--	--	-----	---	----------------	-----------------	---	----	--

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. хапещи / гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(f-h) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) Карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват степен на употреба / икономическо значение / рестрикции

X РД11-1921/31.07.2026

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN401	SP1 SPe1 SPe3 SPe8
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1					