



ЗАПОВЕД

18.8.2026 г.

X РД11-2026/18.08.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4325/12.08.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 22495/24.10.2024 г. и вх. № 27714/09.12.2025 г. от Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L. Spain, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 17976/26.06.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БРОНТЕС 2,5 ЕК**

Активно вещество: делтаметрин/deltamethrin - 25 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L. Spain

Производител на активното вещество пеларгонова киселина: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L. Spain

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Размер и материал на опаковката:

25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 80 мл, 100 мл, 120 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл, 600 мл и 1 л бутилка от COEX (HDPE/EVOH);

25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 80 мл, 100 мл, 120 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл и 500 мл бутилка от COEX (HDPE/EVOH) в картонена кутия;

2 л, 3 л, 4 л, 5 л, 10 л, 15 л и 20 л контейнер от COEX (HDPE/EVOH) или COEX: HDPE+PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, гащеризон, защитни очила/маска и респираторна маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра, с включена растителнозащитна ивица 30 метра, при ягоди, домати, патладжан, тиквички, краставици, корнишони, пъпеш и диня, с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра или дюзи намаляващи разпръскването с 95%, при семкови овощни видове (ранно и късно приложение) с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра при маслини, с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра буферна зона или нетретирана буферна зона от 20 метра буферна зона с включени дюзи за намаляване на разпръскването с 20%, при семкови овощни видове с цел опазване на нецелевите артроподи.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра буферна зона или нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи за намаляване на разпръскването с 30 %, при маслини, с цел опазване на нецелевите артроподи.

1.8. Опасен за пчелите. Не допускайте пчели и други опрашители в оранжерията (затворете всички отвори с паравани).

1.9. Опасен за пчелите/ Да не се прилагала при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители/ Да не се използва, където има активна паша на пчели / Преместете еле покрийте пчелните кошери по време на използването на ПРЗ **БРОНТЕС 2,5 ЕК** / Да не се прилага повреме на цъфнала плевелна растителност/ Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество делтаметрин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **30.06.2029 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БРОНТЕС 2,5 ЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БРОНТЕС 2,5 ЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L. Spain.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

11. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

18.8.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

18.8.2026 г.

X РД11-2026/18.08.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: БРОНТЕС 2,5 ЕК

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно/и вещество/а: делтаметрин/deltamethrin - 25 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Г активно вещество/ дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Семкови овощни видове ябълка MABSD, круша PYUCO, дюля CYDOB, мушмула MSPGE	П	Ябълков плодов червей (<i>Laspeyresia pomonella</i> , CARPPO), зелена ябълкова листна въшка (<i>Aphis pomi</i> , APHIPO), живовлекава листна въшка (<i>Dysaphis plantaginea</i> , DYSAPL)	Конвенционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	30-50 мл/дка	100-140 л/дка	0,75 – 1,25 г а.в./дка	7	Да не се третира по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

2	Маслини (трапезни) OLVEU	П	Маслинов костилков пробивач (<i>Prays oleae</i> , PRAYOL)	Конвен- ционална наземна техника	По време на цъфтеж	1	-	40 мл/дка	80-100 л/дка	1 г а.в./дка	7	
			<i>Bractrocera oleae</i> , DACUOL		В зависимост от числеността в уловките			50 мл/дка	100- 140 л/дка	0,25* г а.в./дка		*до 5 уловки на дка
3	Ягоди FRAAN	П	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO), оранжерийна картофена листна въшка (<i>Aulacorthum solani</i> , AULASO), ягодова листна въшка (<i>Chaetosiphon fragaeifolii</i> , CHTSFR), прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE), <i>Spodoptera sp.</i> SPODSP	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)
4	Домати LYPES, патладжан SOLME	П	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO), прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , MYZPE),	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	При патладжан да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)

			памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>, HELIAR), сребристоточкова ношенка (<i>Chrysodeixis chalcites</i>, PLUSCH), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>, PYTOGA), малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>, LAPHEG), египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>, SPODLI)									
5	Тиквички CUUPG	П	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>, APHIGO), прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>, MYZPE), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>, HELIAR), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>, PYTOGA), египетска ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>, SPODLI)	Конвенционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)

6	Краставици, корнишони CUMSA	П	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO), прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , MYZPE), <i>Hyperomyzus lactucae</i> , HYPELA, памукова нощенка (<i>Helicoverpa armigera</i> , HELIAR), египетска нощенка (<i>Spodoptera littoralis</i> , SPODLI)	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)
7	Пъпеш CUMME	П	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO), прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , MYZPE), памукова нощенка (<i>Helicoverpa armigera</i> , HELIAR), египетска нощенка (<i>Spodoptera littoralis</i> , SPODLI), малка полска нощенка (<i>Spodoptera exigua</i> , LAPHEG), гамозначна нощенка (<i>Autographa gamma</i> , PYTOGA)	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)

8	Дини CITLA	П	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO), картофена листна въшка (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU), памукова нощенка (<i>Helicoverpa armigera</i> , HELIAR), египетска нощенка (<i>Spodoptera littoralis</i> , SPODLI), малка полска нощенка (<i>Spodoptera exigua</i> , LAPHEG), гамозначна нощенка (<i>Autographa gamma</i> , PYTOGA)	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
---	---------------	---	--	---	-----------------------------	---	----	--------------	-----------------	--------------------	---	--

9	Карфиол BRSOB, броколи BRSOK	П	Бяла зелева пеперуда (<i>Pieris brassicae</i> , PIERBR), репна пеперуда (<i>Pieris rapae</i> , PIERRA), памукова нощенка (<i>Helicoverpa armigera</i> , HELIAR), зелева нощенка (<i>Mamestra brassicae</i> , BARABR), гамозначна нощенка (<i>Autographa gamma</i> , PYTOGA), египетска нощенка (<i>Spodoptera littoralis</i> , SPODLI), зелев молец (<i>Plutella xylostella</i> , PLUTMA)	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	7	
---	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------	---	----	--------------	-----------------	--------------------	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

18.8.2026 г.

X РД11-2026/18.08.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество/дка мин/макс	(l)	(m)
1	Круша PYUCO, дюля CYDOV, мушмула MSPGE	П	Ябълкова листна бълха (<i>Psylla mali</i> , PSYLMAL)	Конвенционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	30-50 мл/дка	100-140 л/дка	0,75 – 1,25 г а.в./дка	7	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)
			Плодова корогризачка (<i>Adoxophyes orana</i> , CAPURE), розуна листозавивачка (<i>Archips rosanus</i> , CACORO)					35-50 мл/дка	100-140 л/дка	0,875– 1,25 г а.в./дка		

2	Маслини (трапезни) OLVEU	П	Маслинова щитовка (<i>Saissetia oleae</i> , SAISOL)	Конвенционална наземна техника	След проява на нападение	1	-	50 мл/дка	100-140 л/дка	1,25 г а.в./дка	7	
3	Ягоди FRAAN	П	<i>Aphis ruborum</i> , APHIRB, - ипсилонова нощенка (<i>Agrotis ipsilon</i> , AGROSP)	Конвенционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)
		О	Листни въшки (<i>Aphis</i> sp., APHISP)			3	14	25-50 мл/дка	50-100 л/дка	0,625 - 1,25 г а.в./дка		
4	Тиквички CUUPG	О	Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO), прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , MYZPE), памукова нощенка (<i>Helicoverpa armigera</i> , HELIAR), гамозначна нощенка (<i>Autographa gamma</i> , PYTOGA), египетска нощенка (<i>Spodoptera littoralis</i> , SPODLI)	Конвенционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)

5	Краставици, корнишони CUMSA	О	Памукова листна въшка (<i>Aphis</i> <i>gossypii</i> , APHIGO), прасковена листна въшка (<i>Myzus</i> <i>persicae</i> , MYZPE), <i>Hyperomyzus</i> <i>lactucae</i> , HYPELA, памукова нощенка (<i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i> , HELIAR), египетска нощенка (<i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> , SPODLI), зимна нощенка (<i>Agrotis segetum</i> , AGROSE), ипсилонова нощенка (<i>Agrotis</i> <i>ippsilon</i> , AGROSP)	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	3	Да не се третира по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
		П	зимна нощенка (<i>Agrotis segetum</i> , AGROSE), ипсилонова нощенка (<i>Agrotis</i> <i>ippsilon</i> , AGROSP)									

6	Карфиол BRSOB, броколи BRSOK	П	Зелева листна въшка (<i>Brevicoryne brassicae</i> , BRVCBR), <i>Lipaphis erysimi</i> , LIPAER, прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i> , MYZPE), MYZUPE зимна нощенка (<i>Agrotis segetum</i> , AGROSE), ипсилонова нощенка (<i>Agrotis ipsilon</i> , AGROSP)	Конвен- ционална наземна техника	След проява на нападение	2	14	50 мл/дка	30-100 л/дка	1,25 г а.в./дка	7	
---	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------	---	----	--------------	-----------------	--------------------	---	--

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

18.8.2026 г.

X РД11-2026/18.08.2026

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Запалими течности, категория 3	H226	GHS02	H226	EUN401	SP1
	H302	GHS05	H302		SPe3
Остра токсичност (орална), категория 4	H304	GHS07	H304		SPe8
	H315	GHS08	H315		
Опасност при вдишване, категория 1	H318	GHS09	H318		
	H336	Опасно	H336		
Дразнене на кожата, категория 2	H400		H410		
	H410				
Сериозно увреждане на очите, категория 1					
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3					
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1					