



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

**ЗА П О В Е Д**

№ *РДМ-293*

София, *03.08* ..... 2017 г.

На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 43, чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. Относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД -242/ 25.01.2017 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 13180/23.08.2016 г. на Синджента България ЕООД,

**НАРЕЖДАМ:**

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500  
СЕ/СИЛБА СЕ

Активно вещество: S-метолахлор – 312,5 г/л  
Тербутилазин – 187,5 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Прътекшън АГ,  
Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество S-метолахлор Синджента Кроп Прътекшън АГ,  
Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество тербутилазин: Синджента Кроп Прътекшън АГ,  
Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland; Оксон СпА, Италия/ OXON Italia SpA

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: суспо-емулсия (СЕ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л - бутилки от HDPE.

## Забележки:


- При смесване, зареждане и приложение на продукта да се носят защитни ръкавици, работен гащеризон, защитни ботуши.
  - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
  - Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
  - В случай на разораване на площите, третирани с продукта, да се засяват царевица или сорго.
  - На площи, третирани с продукта, могат да се засяват/засаждат маруля, тиква, фъстъци, картофи, цвекло, моркови, бобови култури, аспержи, спанак, диня, пъпеш, краставици, пипер, тютюн, домати, детелина, люцерна и др. фуражни култури 10 месеца след приложението на продукта и 7 месеца - при сеитба на зърнено-житни, райграс, рапица, слънчоглед.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
  3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
  4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество S-метолахлор, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2019 г.
  5. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК/СИЛБА СК, разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01001-ПРЗ-3/19.03.2015 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
  6. На основание чл. 66 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.
  7. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 12/03.02.2018г.**

Име на продукта: ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ

Формуляция: суспо-емулсия (СЕ)

Концентрация на активното вещество: \* S-метолахлор – 312,5 г/л

\* \* Тербутилазин – 187,5 г/л

Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/Вид (f-h)	Приложение			Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Стадий на развитие и сезон (i)	Брой макс (k)	Интервал между приложенията, дни (мин)	Мл. продукт т/дка	Вода литра/дка	Гр.а.в. / дка		
(a)	(b)	(c)	(f-h)	След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите	1		350-400 мл/дка	20-30 л/дка	109,4-125,0 г/дка * +	(l)	(m)
Слънчоглед	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	Или ВВСН 10-14 Котелдоните са напълно разтворени – четири листа (втора двойка листа) на културата, преди поникване на плевелите					65,6-75,0 г/дка * *	-	

Царевица	II	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите	I	-	400-450 мл/дка	20-30 л/дка	125,0 – 140,6 г/дка * + 75,0 – 84,4 г/дка **	60 дни за фуражна царевица
Царевица	II	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 10-14 Поява на първи лист – разтваряне на четвърти лист на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните	I	-	350-400 мл/дка	20-30 л/дка	109,4-125,0 г/дка * + 65,6-75,0 г/дка **	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(д) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(е) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напръскване, намокряне

(ж) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(з) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(л) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(м) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/регистрация

Приложение № 2 към Заповед №...*РД 11-243/05.02.2014г.*

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, категория 1	H317	GHS07	H317	EUN401	SP Фрази: SP1, SPe3
Дразнене на очите, кат. 2	H319	GHS08	H319		
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2	H373	GHS09	H373		
Опасно за водната среда – хронична опасност, кат. 1	H410	Внимание	H410		