

РАКУМИН ПАСТА

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г.

Лице, което пуска на пазара :

Байер България ЕООД
1510 София
ул. Резбарска № 5.
тел. +359 2 8140164

Производител:

Bayer Environmental Science SAS
16 rue Jean-Marie Leclair
CP 106
69266 Lyon Cedex 09
France

Наименования на активното вещество: Куматетралил - 0.375 g/ 1000 g (0.0375 % w/w).

Област на приложение: готова за употреба родентицидна примамка за контрол на плъхове (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) и домашни мишки (*Mus musculus domesticus*) в и около частни, обществени и земеделски сгради. Биоцидът е ефективен срещу плъховете и домашните мишки във всички стадий на тяхното развитие. Продуктът трябва да се прилага само в защитени от отваряне дератизационни кутии и покрити отровни точки на закрито и на открито (само около сгради).

- Привлекателен състав на сместа: гризачите ще изяждат примамките редовно.
- Може да се използва на влажни места: консистенцията на сместа гарантира добро запазване на примамката.

Начин на действие : Примамката съдържа куматетралил, антикоагулант, провокиращ смъртоносно вътрешно кървене при плъховете, които умират далеч от поставената примамка. Ефектът се проявява няколко дни след поглъщане, така че смъртта на плъховете изглежда естествена и не предизвиква подозрение сред събратята им.

Само за професионална употреба.

Пиктограма « Битрекс » :

Съдържа Vitrex®: силния горчив вкус на Vitrex® намалява риска от случайно поглъщане от хора и в частност деца, без да намалява привлекателността на продукта за плъховете.

Биоцидният ефект настъпва 3 до 15 дни след поглъщане на примамката.

Група 3 Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 14 Родентициди.

Внимание



H302 Вреден при поглъщане.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P264 Да се измие старателно след употреба.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P301+312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

P330 Изплакнете устата.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните изисквания.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Категория на потребители: професионална.

Вид на биоцидния препарат – паста.

Описание на начина на употреба:

Броят на сашетата поставени в една дератизационна кутия и покрита отровна точка трябва да съответства на разрешената доза за употреба.

Броят на поставените дератизационни кутии и покрити отровни точка зависи от мястото, което ще се третира и степента на нападение.

Разстоянието между дератизационните кутии и покритите отровни точки трябва да съответства на посоченото на етикета.

Проверявайте и допълвайте дератизационните кутии и покритите отровни точки няколко дни след първото залагане на примамката и след това веднъж седмично, докато примамката продължава да бъде консумирана.

Не почиствайте дератизационните кутии между две приложения.

Дератизационните дейности срещу плъхове и мишки трябва да продължат докато се преустанови консумацията на примамката, но не повече от 5 седмици. Нормалната дератизационна кампания продължава 3 седмици.

Замърсената примамка и трупове на гризачите трябва да се събират при всяка инспекция на мястото на третиране.

При завършване на дератизацията и постигането на контрол на гризачите цялата остонала примамка трябва се събира и изхвърля като отпадък от пестициден продукт.

Антикоагулантните примамки не трябва да се прилагат като постоянни примамки, въпреки че залагането може да подължи с примамки не съдържащи активно вещество.

В и около сгради:

- Плъхове, висока степен на нападение: от 100 г до 200 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 3 до 10 метра.

-Плъхове, ниска степен на нападение:
от 100 г до 200 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 5 до 20 метра.

-Мишки, висока степен на нападение:

от 10 г до 20 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки от 2 до 10 метра.

-Мишки, ниска степен на нападение:

от 10g до 20g от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 5 до 20 метра.

- Сашетата се поставят в БЕЗ ДА СЕ ОТВАРЯТ.
- Съхранявайте и пазете от директна светлина
- Съхранявайте при максимална температура от 40°C
- Да се пази далече от достъп на деца..
- Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
- По време на работа да не се яде, пие и пуши.
- Не поставяйте върху повърхности или материали, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти, за да предотвратите замърсяване на храни за хора и животни.
- Предотвратете достъпът на деца, домашни любимци и диви животни.
- Поставете дератизационната кутия на места защитени от дъжд и наводняване.
- Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
- Дератизационните кутии трябва да съдържат само родентициди.
- Носенето на ръкавици е задължително.
- Не отваряйте сашетата.
- Измивайте ръцете си след употреба.
- Отстранете всички дератизационни кутии след третирането.
- Третирането трябва да се прилага като се редува използването на други активни вещества, за да се предотврати създаването на резистентност и кръстосана резистентност спрямо антикоагулантите..
- Вземете мерки за интегрирана борба с вредителите като например химички и физични методи и хигиенни практики.
- Проверете ефикасността на продукта на място: при нужда, причините за намалената ефикасност следва да бъдат проучени и да се потърси възможно доказателство за изградена резистентност.
- Не използвайте продукта в място, където е установено или се подозира наличието на резистентност.
- Потребителите следва да докладват директно на притежателя на регистрацията относно всякакви смущаващи сигнали, за които може да се приеме, че сочат за развитие на резистентност.

Мерки за първа помощ:

В случай че бъдете експонирани на продукта, свържете се незабавно с център за контрол отравянията или с медицинско лице и опишете ситуацията (представете информацията от етикета и оценете степента на излагане):

- При вдишване: дишайте чист въздух и си почивайте.
- При контакт с кожата: свалете замърсените дрехи, измийте кожата със сапун, след което изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители или разреждатели.
- При контакт с очите: Измийте обилно под течаща вода (по възможност, хладна) за няколко минути, като държите клепачите отворени под струята течаща вода.
- При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Не предизвиквайте повръщане. Независимо от количеството погълнат продукт, не яжте и не пийте след това. При спешни случаи, обадете се на 112.

Забележка към лекаря: продуктът Ракумин Паста съдържа антикоагулантен родентицид; може да е необходимо лечение с витамин К1 за продължителен период от време.

- Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
- Не изхвърляйте продукта в околната среда или в канализацията
- Изхвърлете дератизационните кутии в центрове за прием на отпадъци или на подходящи за това събирателни пунктове.
- Опаковката да не се използва отново или рециклира.
- Не изконсумираните примамки, не използваните примамки, както и примамките изхвърлени извън дератизационните кутии, трябва да се събират и изхвърлят в центрове за събиране на отпадъци или на подходящи за това събирателни пунктове

Партиден номер:

Дата на производство:

Годен до:

Опаковка:

На дератизационна кутия трябва да се постави следният текст:

- Не отваряйте дератизационната кутия.
- Да се пази далече от достъп на деца..
- По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Мерки за първа помощ:

В случай че бъдете експонирани на продукта, свържете се незабавно с център за контрол отравянията или с медицинско лице и опишете ситуацията (представете информацията от етикета и оценете степента на излагане):

- При вдишване: дишайте чист въздух и си почивайте.
- При контакт с кожата: свалете замърсените дрехи, измийте кожата със сапун, след което изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители или разреждатели.
- При контакт с очите: Измийте обилно под течаща вода (по възможност, хладна) за няколко минути, като държите клепачите отворени под струята течаща вода.
- При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Не предизвиквайте повръщане. Независимо от количеството погълнат продукт, не яжте и не пийте след това. При спешни случаи, обадете се на 112.
- Забележка към лекаря: продуктът Ракумин Паста съдържа антикоагулантен родентицид; може да е необходимо лечение с витамин К1 за продължителен период от време.

Върху сашето се поставя следният текст:

Не отваряйте сашето.