

3. Държава-членка по произход на продукта за растителна защита **КАБРИО ТОП** е Италия.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до приключване на процедурата по подновяване на референтния в Р. България продукт за растителна защита **КАБРИО ТОП** (Удостоверение № 0512-ПРЗ-2/14.05.2014 г., разрешен на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията, Заповеди № РД 09-868/19.12.2003 г.; РД 12-62/29.12.2006 г. на министъра на земеделието и горите и писмо с вх. № 6812 от 08.04.2014г.).
5. На основание чл. 61, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия на продукта на фирма *Агропал* ЕООД.
6. На основание чл. 61, ал. 5 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок от получаване на разрешението за паралелна търговия, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
7. На основание чл. 61, ал. 6, преди пускане на пазара и употреба на продукта притежателят да уведоми писмено ЦУ на БАБХ за количеството и номера на съответната партида, която ще се пуска на пазара.
8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби на продукта към Заповед № ...*РДМ-2020/12.10.2018*...

Име на продукта: **КАБРИО ТОП**
 Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активно/и вещество/а: пираклостробин - 50 г/кг
 Концентрация на активно/и вещество/а: метирам - 550 г/кг

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки	
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	г/мл или г/кг продукт /дка	Вода л/дка			г а.в./дка
1.	Лозя	(a)	(c) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	-	-	-	7-10	0,15% (150 г/дка)	-	-	28	(m)
2.	Лозя		Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i>)	-	-	-	10-14	0,2% (200 г/дка)	-	-	28	-
3.	Лозя		Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	-	-	-	-	0,2% (200 г/дка)	-	-	28	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. халещи/гризели или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCPF Колове – GIFAР Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практичките условия на употреба

(l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции